

洋葱紫斑病防治，中甲高黄，黄皮洋葱，中日照，进口洋葱

产品名称	洋葱紫斑病防治，中甲高黄，黄皮洋葱，中日照，进口洋葱
公司名称	石家庄正业蔬菜销售有限公司
价格	180.00/普通
规格参数	
公司地址	石家庄市裕华区裕华东路106-1号
联系电话	0311-67667773 13803376310

产品详情

中甲高黄—中日照黄皮洋葱种子 电话：18931885036，QQ：1307717739 中熟品种生长整齐，熟期一致，不易抽薹。鳞茎圆球形，外皮淡白黄色，内部鳞片乳白色，球径8厘米左右。单球重320克以上，味甜而微辣，品质优。耐寒性强，适应性广，高抗紫斑病、疫病，较抗霜霉病。规格：100g/罐。石家庄正业蔬菜销售有限公司，经营洋葱购销，洋葱种苗购销，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

洋葱紫斑病防治【症状】主要为害叶和花梗，叶片和花梗染病，初呈水渍状白色小点，后变淡褐色圆形或纺锤形稍凹陷斑，继续扩大呈褐色或暗紫色，周围有黄色晕圈。湿度大时，病部长出同心轮纹状排列的深褐色霉状物，病害严重时，致全叶变黄枯死或折断鳞茎染病，多发生在鳞茎颈部，造成软腐和皱缩，茎内组织深黄色。**【病原】***Alternaria porri*称葱链格孢，属半知菌亚门真菌。分生孢子梗淡褐色，单生或5~10根束生，有隔膜2~3个，不分枝或分枝少；分生孢子褐色，长棍棒状，具横隔膜5—15个，纵隔膜1—6个；喙孢较长，有时分枝，具隔膜0~7个。**【发生规律】**以菌丝体在寄主体内或随病残体在土壤中越冬，温暖地区以分生孢子在葱类植物上辗转为害；翌年条件适宜时产出分生孢子，借气流或雨水传播，经气孔、伤口或直接穿透表皮侵入。生长中后期发病严重。浙江及长江中下游地区主要发生在4~7月和9~11月。常年连作，砂土地，播种过早，种植过密，田间郁闭，管理粗放，经常缺肥缺水，植株生长过弱，葱蓟马为害重发病重。**【防治方法】**与非百合科蔬菜轮作2年以上。施足充分腐熟的有机肥，适期播种，合理密植；注意及时防治蓟马；加强田间管理，适时适量施肥浇水；雨后及时排除田间积水。适时收获，低温贮藏，防止病害在贮藏期继续蔓延。收获后及时清洁田园。