

乐山大量孵化吃草散养鹅 提供鹅苗养殖技术

产品名称	乐山大量孵化吃草散养鹅 提供鹅苗养殖技术
公司名称	广汉中力家禽养殖有限责任公司
价格	15.00/个
规格参数	中力家禽:1
公司地址	四川省广汉市金鱼镇月湾村
联系电话	15386681677

产品详情

雏鹅的饲养管理

1. 育雏密度及湿度

为有效利用鹅舍设施，一般雏鹅的饲养密度为每平方米20~25只，用高为35厘米的围栏将雏鹅分群，舍内湿度控制在60~65，湿度过高或过低，都会使雏鹅的体质下降，影响生长，所以应勤添垫草，换气除湿，降低湿度。

2. 挑选雏鹅

挑选健壮的鹅苗，健鹅苗的特征是卵黄吸收好，脐部收缩完全，腹部松软，腿部粗壮有力，体重适中，精神活泼，眼睛有神，用力一抓感到其挣扎有力，有弹性。如发现卵黄吸收不完全，可用25瓦灯泡放在雏鹅腹部烘5~10分钟，促进卵黄吸收。

3. 雏鹅的饮水和开食

为缓解运输过程中带来的应激，可在水中加入抗菌素、恩诺沙星等。鹅苗进舍后，1~2小时内应先饮水，身体弱不会饮水的，应人工驯饮；2小时后，把准备好的小鹅专用饲料、切碎的嫩黑麦草、苦苣菜放入料槽，任其采食，对个别不会食料的雏鹅，人工驯食1~2次。

4. 饲喂方法

雏鹅的消化系统发育未完全，体积较小，雏鹅从食入到排出经过消化道的时间为2小时左右。因此饲喂雏鹅要做到少食多餐。1周龄前，每天可喂8~10次，其中2~3次在晚上喂，这是提高育雏成活率的关键；2周龄时每天可喂6~8次，其中晚上一定要喂1~2次；3周龄起鹅舍内放入砂盘，保健砂砾以绿豆大小为宜。

5. 饲料和牧草

根据雏鹅的生理特点，应选用优质小鹅专用饲料，这样不仅可以满足雏鹅的生长需要，而且可以提高育雏成活率，从而增加养鹅的经济效益。牧草可选用嫩黑麦草、苦苣菜等多汁青绿饲料，切碎后与精料拌和饲喂，供雏鹅自由采食，育雏期精料和牧草的比例为1:2。

6. 光照和温度

观察雏鹅的叫声和在舍内分布情况，根据天气变化情况，适当调整温度和光照。1周龄前要保持全天光照，舍温28~30℃；2周龄保持晚间光照，舍温24~28℃，以后逐步调低舍温；4周龄前舍温保持在20℃以上，晚上喂料时使用灯光照明。

7. 分群、卫生及通风

随着鹅体的长大，1周龄后每平方米养雏鹅20只，2周龄后每平方米养雏鹅15只，随后视天气情况，如果适宜可大圈饲养，但每群不超过200只。雏鹅在生长过程中，每天从身上抖落的皮屑、羽毛较多，可在每天中午温度较高时抽风换气，没有条件的可短时间开窗开门换气。勤扫栏舍，清除粪便，勤换垫料，保证舍内空气新鲜，同时搞好环境清洁卫生。

8. 定期消毒育雏舍

每天打扫鹅舍，经常清洗饲料槽、水槽，每隔5~7天用

9. 严格执行免疫计划

根据本地实际情况和免疫程序，及时、正确地进行免疫，加强雏鹅对疫病的抵抗力。

联系人：崔经理