

金鱼草种子 92 (%) 99.9 (%)

产品名称	金鱼草种子 92 (%) 99.9 (%)
公司名称	喀喇沁旗世杰花卉种子繁育基地
价格	6.00/克
规格参数	发芽率:92 (%) 品种纯度:99.9 (%) 颜色:混色
公司地址	内蒙古自治区赤峰市王爷府镇富裕地村
联系电话	86-04763759660 13847688909

产品详情

发芽率	92 (%)	品种纯度	99.9 (%)
颜色	混色	学名	金鱼草
生长适温	10-18C	科属	玄参科
株高	20-25 (公分)		

金鱼草

别名：龙头花

科属：玄参科

秋播一年生草本，

因花似金鱼，故得名。金鱼草色彩丰富，除蓝色外，其余各色齐全。近年来培育出很多多倍体品种及优良的一代杂种，不仅花大而密、色彩艳丽、茎秆粗壮高大，而且耐寒性、抗病性都强，收成稳定。作为切花，金鱼草通常在12月-翌年4月上市。

生态习性: 金鱼草较耐寒，稍耐半荫，在凉爽环境生长健壮，花多而鲜艳，通常作二年生栽培，但华北、东北也有作一年生栽培者。其品种间容易混杂，引起品种退化。生长适温白天15 -18 ；夜间10 左右，即使降到5 -6 ，也无大碍。但在开始生蕾的时候，若遇0 左右的低温，则表现有"盲花"。冬季开花的品种，若保持适宜温度，则不受日照影响，花芽分化后，12月-翌年1月开花。但夏季开花的品种，仅在长日照条件下，才分化花芽和开花。金鱼草的花期，可利用温室，加之不同的播种期、栽培法以及不同的品种来调节。通常露地栽培，8月下旬或9月播种，翌年4月-5月开花；早春冷床育苗或春夏播种，可在6月-7月或9月-10月开花，但不及秋播生长良好，而且花期较短。秋天播种，则翌年开花，短剪后，可至晚秋开花不绝。冬季作切花用者，常于夏末播种，露地培育，秋凉移入温室，秋冬两季白天保持22 ，夜间10 以上，12月份可陆续开花。

品种: 优良品种应当属早生系, 品质优良, 切花后能经常保持花色鲜艳; 耐寒性强, "盲花"少; 株高而粗, 花茎硬, 笔直生长。通常12月份开始切花, 翌年3月-4月份也能二次切花, 二次切花的品质也较好, 繁殖及栽培: (1) 繁殖 金鱼草主要是播种繁殖, 但也可扦插。对一些不易结实的优良品种或重瓣品种, 常用扦插繁殖。扦插一般在6月-7月份进行。金鱼草种子细小, 灰黑色, 每克约8000粒, 发芽率60%。在13-15℃播种, 1周-2周出苗。插种时需混沙撒播。通常为了在12月上旬开花, 通过摘心而培养3本-4本(一本为一枝切花)的, 7月下旬播种为宜。不摘心而培养独本的, 8月中下旬播种为宜。(2) 栽培 在小叶真叶开始长出时, 以3厘米×3厘米的间距进行第1次移植; 在苗高5厘米-6厘米时, 再以10厘米×10厘米的间距进行第2次移植; 苗高10厘米-12厘米时为定植适期。7月中下旬播种的, 9月中旬定植; 8月中旬播种的, 10月中旬定植。在栽培室用宽1米的地床, 不摘心培养独本的, 9厘米见方定植; 摘心培养4本-5本的, 15厘米-18厘米见方定植。培养4本-5本的, 是在定植2周后摘心, 留下从基部长出的4枝-5枝粗壮侧枝。无论是培养独本还是多本, 株高25厘米时, 都要及早摘除从基部发出的侧枝。不久, 待苗高长到25厘米-30厘米时, 可张网一层或两层。