

酸枣仁提取物(总皂甙2%)

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 酸枣仁提取物(总皂甙2%) |
| 公司名称 | 西安康威生物工程有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 主要成分:总皂甙 提取来源:为鼠李科植物酸枣的种子。 外观:淡黄色 |
| 公司地址 | 西安北关正街1号 |
| 联系电话 | 029-8263695 13700276225 |

产品详情

| | | | |
|----------|-------------------|------|-------------|
| 主要成分 | 总皂甙 | 提取来源 | 为鼠李科植物酸枣的种子 |
| 外观 含量 | 淡黄色 1-2% (%) | 检测方法 | UV |

【来源】为鼠李科植物酸枣的种子。【植物形态】酸枣(《本经》),又名:棘(《诗经》),槭(《尔雅》),山枣(陶弘景),野枣(任防《述异记》)。落叶灌木或小乔木,高1~3米。老枝褐色,幼枝绿色;枝上有两种刺,一为针形刺,长约2厘米,一为反曲刺,长约5毫米。叶互生;叶柄极短;托叶细长,针状;叶片椭圆形至卵状披针形,长2.5~5厘米,宽1.2~3厘米,先端短尖而钝,基部偏斜,边缘有细锯齿,主脉3条。花2~3朵簇生叶腋,小形,黄绿色;花梗极短1萼片5,卵状三角形;花瓣小,5片,与萼互生;雄蕊5,与花瓣对生,比花瓣稍长;花盘10浅裂;子房椭圆形,2室,埋于花盘中,花柱短,柱头2裂。核果近球形,直径1~1.4厘米,先端钝,熟时暗红色,有酸味。花期4~5月。果期9~10月。生长于阳坡或干燥瘠土处,常形成灌木丛。分布辽宁、内蒙古、河北、河南、山东、山西、陕西、甘肃、安徽、江苏等地。本植物的根皮(酸枣根皮)、棘刺(棘针)、叶(棘叶)、花(棘刺花)亦供药用,各详专条。【采集】秋季果实成熟时采收,将果实浸泡一宿,搓去果肉,捞出,用石碾碾碎果核,取出种子,晒干。【功用主治-酸枣仁的功效】养肝,宁心,安神,敛汗。治虚烦不眠,惊悸怔忡,烦渴,虚汗。