

曲靖供应天露黑鸡脱温苗 红冠鸡苗 自配料技术

产品名称	曲靖供应天露黑鸡脱温苗 红冠鸡苗 自配料技术
公司名称	广汉中力家禽养殖有限责任公司
价格	5.00/个
规格参数	中力家禽:1
公司地址	四川省广汉市金鱼镇月湾村
联系电话	15386681677

产品详情

广汉中力家禽养殖有限责任公司成立于2010年，是一家以种养、孵化、销售为一体的公司。常年为各位新老客户提供技术服务，指导养殖户掌握基础知识，提高养殖水平。

特点

- 1、生长速度快;饲料转化率高，是一种经济利润高的品种;抗病能力强。快大型乌鸡高腿黑羽、体型大、产肉性能好，鲜嫩，维生素高。
- 2、对外界适应能力强，成活率高，适合大棚养殖、放养等;
- 3、本品种体形饱满，体躯稍长，冠具有乌黑特点、胸肌、腿肌丰满，是送佳品。
- 4.饲养容易 存活率高

鸡苗开食时要注意什么问题

开食时要注意下列问题：

- 1.适时开食 开食时要注意时间，不能过早或晚，要求适时开食。通常雏鸡出壳后初次吃料，多在孵出后12-24小时内或当有1/2-1/3雏鸡有啄食行为开食为宜，不超过36小时。过晚开食会使雏鸡失水、体弱、影响正常的成长发育。
- 2.挑出体弱雏鸡 雏鸡运到育雏舍，经休息后，进行清点将体质软弱的雏鸡挑出，因为雏鸡数量多，个体小，体质差、不会吃料的雏鸡另群饲养，以便加强饲养，使每只雏鸡均能开食和饮水，促其生长。
- 3.延长照明时间 开食时为了有助于雏鸡觅食和饮水，出壳后3天内采取昼夜24小时光照，其光照强度为每0.37平方1瓦光源。

4.选择开食饲料 开食饲料，一般要求营养丰富，适合性佳，容易消化吸收，可以选择碎米、碎玉米等饲料。大型鸡场或工厂化养鸡场，开食料一般采用粉料或碎料。

5.开食不可过饱 开食时要求雏鸡找到采食的食槽和饮水器，会吃料能饮水，但不能过饱，尤其是经过长时间运输的雏鸡，此时又饥又渴，如任其暴食暴饮，会造成消化不好，严重时致大批死亡。

6.不能使雏鸡湿身

注意盛水器的规模，大小适宜，以免雏鸡进入水盆，而致湿身造成挤压取暖窒息折损。

另开班鸡鸭鹅养殖技术学习，先学习后养殖，让您养殖无忧！

育雏天

1.鸡未到达鸡舍前，先将鸡舍预温到35 ~ 37 ;湿度控制在65 ~ 70之间，并将营养物、清理、水、饲料、垫料和清理设施准备齐全。

2.雏鸡进入鸡舍后，应迅速上笼，安排好饲养密度，一般平养按每平方米20只 ~ 30只，笼养每平方米50只 ~ 60只。

3.上笼后立即给水，好是室温的凉开水，饮水中加5的葡萄糖和0.1维生素，每天饮水4次。

4.雏鸡饮水4小时后，可以往料槽或料盘放料，好选用高蛋白水平的雏鸡开食料或强化料，粗蛋白水平不能低于19.5，每天喂料4次;另外特别注意不能断水，否则影响雏鸡生长。

5.应给予全天光照(即24小时)，光照强度为10勒克斯。

具体控制方法：由于刚出壳的幼雏视力弱，为了让雏鸡尽早熟悉环境，采食和饮水，要求给雏鸡提供光照时间长、强度大的舍内环境，鸡舍灯泡的安装，应以靠近鸡群活动区域为好，高度一般距地面2.1米 ~ 2.5米，灯泡间的距离应等于其高度的1倍 ~ 1.5倍。此外，为了获得较均匀的光照度，灯泡应交错设置，灯泡的瓦数以60瓦为宜，灯泡距离鸡体的高度一般在1.8米 ~ 3.1米之间，如有灯罩为2.5米 ~ 3.1米，无灯罩的为1.8米 ~ 2.2米，千万不要让灯泡离鸡太近，避免发生啄肛、啄羽现象。

联系人：崔经理