

捕食螨-红锈蜘蛛的天敌 广东潮州

产品名称	捕食螨-红锈蜘蛛的天敌 广东潮州
公司名称	潮州中天农业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地/厂家:广东潮州 等级:A 品种:捕食螨-(天敌)
公司地址	广东省潮州市红山林场内一幢
联系电话	0768-2101782 13670760234

产品详情

产地/厂家：广东潮州

等级：A

品种：捕食螨-(天敌)

类型：经济型

物种特征：活性动物

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;!-- .at_1{font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at_2{mso-spacerun: yes} .at_0{margin: 0cm 0cm 0pt} --&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

“捕食螨”生物防治技术防治柑桔红蜘蛛介绍

柑桔红蜘蛛的为害，历来是柑桔种植户最为头疼的问题。“捕食螨”生物防治技术.该项技术经公司技术专家及大学教授精心研究.通过采集野生钝绥螨进行人工繁殖.经过反复试验.终于成功总结出一套工厂化繁殖钝绥螨先进技术并在柑桔园试验成功。取得了连续控制柑桔红蜘蛛为害长达13个月的显著防治效果。该项技术深受广大柑桔种植户的欢迎。

“以螨治螨”生物防治技术应用要求：

一、使用对象 3~5年生柑桔树。或者是树冠大于1米以上的柑桔树。二、清园

“以螨治螨”生物防治技术是柑桔红蜘蛛防治的一项全新技术。。要求在红蜘蛛低密度的条件下释放捕食螨，释放前7—8天.检查红蜘蛛基数.若每叶平均超过2只以上.则应用0.5% 1500倍液印楝素或其它生物农药进行喷洒.对锈蜘蛛介壳虫也要低毒喷洒.以压低虫口密度.再释放.释放后必须禁止使用化学农药.为捕食螨创造良好生存环境条件.这样受益较大.效果显著。

三、果园种(留)草 果园实施“生草控制”管理.释放捕食螨的果园一定要种(留)草，为捕食螨提供补充食物源和良好的栖息环境条件。每次对杂草处理不能超过总量的一半.捕食螨释放后严禁喷洒除草剂.以后根据捕食螨.红蜘蛛的生长情况再进行割除.尽量保持果园生态环境稳定.以确保捕食螨和其它天敌生存空间。

四、释放时间

果园释放捕食螨的时间，应根据果园的具体情况而定，一般应在果园用药低峰期。春季在晴天或阴天释放。禁止雨天释放。温度20摄氏度为宜。秋季晴天或阴天释放温度20—25摄氏度为宜。

五、释放量
每年一次。每株一包(3~5年生柑桔树。或者是树冠大于1米以上的柑桔树。)

六、释放方法
将装有捕食螨的包装袋沿虚线剪下。把袋盖。盖于顶端防止雨水渗入。再用图钉按在树中间的树叉上以防雨淋及蚂蚁侵害。

七、注意事项
1、捕食螨从出厂到释放，一般不超过15-25天；
2、运回未释放的捕食螨，不得将其置于被阳光直射的、高温高湿、有毒、受其他竿物侵扰的地方，一般可在15~28度的条件下保存10-15天；
3、不要用力捏、挤压装有捕食螨的袋子。
4、不能分装释放或隔株释放，也不能移动释放，更不能撒施。
5、要做好果园清园和释放捕食螨时间上的衔接建议最好在3月下旬至4月上旬施放，此时虫口基数适中，且可控制4—5月的虫口高峰，效果会更好一些。：本包装已申请专利。专利号：200730296277.4