

温江区灭白蚁公司，温江区除白蚁公司，温江区白蚁防治公司

产品名称	温江区灭白蚁公司，温江区除白蚁公司，温江区白蚁防治公司
公司名称	成都绿卫有害生物防治有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务人数:1-2人 质保期:2年 预约时间:2天
公司地址	成都市锦江区晨辉北路3号4层19号
联系电话	15208173414 15208173414

产品详情

温江灭白蚁公司，温江除白蚁公司，温江白蚁防治公司 欢迎来电咨询！

白蚁巢外的生物

白蚁巢外的生物，多数是捕食白蚁的，如白蚁分群飞翔时各种捕食性鸟类，蝙蝠，直接挖取白蚁为食的食蚁兽、穿山甲等，而这些天敌多数表现为季节性的临时性捕食，并非专性的捕食白蚁者。

土豚常用其钩形利爪捣毁蚁巢，并以其长舌舐白蚁为食；南美洲的大蚁熊，以其大爪刨开白蚁巢，舐食白蚁。

生活在我国长江以南的国家二级保护动物穿山甲（又名鱗鲤），可生活在白蚁旧巢腔内，夜间出洞觅食；也可以在地表或树干上扒开白蚁泥被觅取白蚁为食。当天气炎热时，它松开鳞甲，散发出特殊气味招引白蚁，当身上爬附了许多白蚁时，则闭合鳞甲爬进水中，再松开鳞甲，使白蚁浮于水面，张口食之。在寒冷季节，它就挖取白蚁巢，取食巢里面的白蚁。

非洲黑猩猩捕食白蚁的方法十分有趣，20世纪60年代初，美国人珍妮·右多尼成功地拍摄了黑猩猩捕捉白蚁的镜头：当黑猩猩发现白蚁巢后，不是捣毁蚁巢取食，而是以草，棍或细枝条从小洞口伸进蚁巢，使白蚁爬满伸进去的草、棍或枝条，然后取出舐食。据报道，取食的白蚁有和胸腊24小时可吞食1000多只工兵蚁。

两栖类的蟾蜍、饰纹姬蛙、黑班蛙、林蛙、青蛙、泽班蛙、腿树蛙等均能捕食白蚁。曾经有人解剖过10多只无尾两栖类，胃内均有白蚁的工蚁、兵蚁或有翅成虫。食量往往还很大，一只蟾蜍可捕食有翅成虫20多只，工蚁、兵蚁100多只。每年有大量的有翅繁蚁纷飞跌落地面被两栖类吃掉。