

青浦区白蚁防治中心-指定白蚁防治中心-白蚁防疫站

产品名称	青浦区白蚁防治中心-指定白蚁防治中心-白蚁防疫站
公司名称	永满科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	白蚁防治中心:电话号码 白蚁防治所:防治电话 白蚁防治站:防治所电话
公司地址	全国
联系电话	4009603303 4009603303

产品详情

青浦区白蚁中心-白蚁中心-白蚁防疫站

定点白蚁中心，白蚁事业单位。白蚁对人类造成的危害主要是房屋建筑以及自然环境，我国已知的白蚁种类分4科、47属、480多种，其中台湾乳白蚁是危害比较大的，会对房屋建筑造成伤害。不同白蚁种类习性不同，造成的危害也不同，杀灭白蚁，建议根据不同白蚁种类实施操作，通过不同的白蚁品种制定杀灭方案。

文摘自网络，如有侵权，请联系删除通过破坏白蚁生存的环境，也可以减少白蚁的侵害

一、杀灭乳白蚁。

上面我们也提到了，台湾乳白蚁是危害比较大的白蚁种类，其也被称为家白蚁，根据近些年的研究发现其与蟑螂的关系比较近，它们不仅会伤害建筑，还会对桥梁以及四旁绿化树木造成损害。杀灭台湾乳白蚁的普遍方式是找到蚁巢并在巢内施药，但是实际工作中我们就会发现蚁巢其实是非常不容易找到的。对此常见的措施就是在白蚁活动频繁的季节，在它们的危害地点或有外露特征部位施药，诱饵药杀方法成本低，操作简便，对环境也不会造成污染。具体的施式，为以下几点：

粉剂毒杀。具体的方式就是每年的3~10月份，在找到蚁巢后，在旁

边打3个品字形的孔，有兵蚁来守卫就喷药，连续施药5~6次，而后堵住孔口敲打附近的木板，以造成蚁群混乱增加其与毒粉的接触机会。

熏杀。这主要是采用磷化铝，对白蚁蚁巢进行烟熏，这种方式非常适合应用在粮仓等环境。

另外还有熏杀法，像国外现在采用热气杀灭法等，也都在一定程度上取得了不错的效果

挖巢。对于有外露迹象能够判断蚁巢位置的，建议可以在距巢外围50~100cm的外置开挖，在不破坏巢体防护层的情况下降巢体整个取出。取出的白蚁巢可以作为鸡饲料，也可以淋油烧毁。

二、杀灭散白蚁

散白蚁全称为黑胸散白蚁，在我们山东地区是比较常见的，它们群体小而分散，主要危害建筑物，危害部位多为门框、窗框和楼板等。相对于乳白蚁来说，这种白蚁类型多用液剂进行毒杀，目前常用方式就是在发现白蚁的位置喷洒药水，毒化散白蚁活动地区的环境，当它们活动时就会因为接触和吸收毒素死亡。此外也可以采用诱杀的方式，不便喷施药水的环境可以采用杉木块诱杀，具体可将杉木块平放在散白蚁出入的地面，发现有白蚁危害时将木板挑起喷施药水，而后再按原状放回木板，效果也非常好。

受太平洋和印度洋暖湿气流的影响，许多省份特别是东南沿海省份，由于气候温暖、雨量充沛、植被丰富，非常适合白蚁的生长、繁衍。

除新疆、青海、宁夏、内蒙古、黑龙江5个省(自治区) 范围外，其余各省(市、自治区)都有白蚁的分布。白蚁分布的北界为:吉林的岭(北纬 $43^{\circ}11'$)北京地区(约北纬 40°)、山西的介休(约北纬 37°)、陕西的韩城(约北纬 35°)、甘肃的文县(约北纬 33°)，再往西与的察隅、墨脱(约北纬 29°)相连。在此线的东南面为已知的白蚁分布区，面积约占全国总面积的40%。

白蚁集中分布在北回归线以南的相关省份，其中云南、福建两省白蚁种类*多，其次是海南、广西、广东和四川4个省(自治区)。青藏高原的隆起，改变了白蚁的分布格局。西南地区由于地形复杂，导致这一地区白蚁种类众多，类型也*为复杂。由此向东白蚁的种类渐渐减少。在青藏高原的南部，白蚁分布的北界不超过北纬 30° ，使得青藏高原南部白蚁分布的北界向南弯曲。

白蚁的预防3、 选用抗蚁性、 耐候性较佳的木材种类对怀疑有

白蚁的部份进行敲击，如果发出空音，则可能有白蚁活动