

绿化苗木苗圃基地 绿化苗木 景致红花继木大杯基地

产品名称	绿化苗木苗圃基地 绿化苗木 景致红花继木大杯基地
公司名称	南昌景致花园绿化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌经济技术开发区枫林西大街1629号
联系电话	15079122733 15079122733

产品详情

绿化苗木对于发枝力一般、生长中等的植物

如紫叶李、樱花、紫荆、西府海棠、榆叶梅等，冬季宜轻剪，疏剪和短截并重，对病虫枝、交叉枝、平行枝、细弱枝进行疏除，强枝进行短截，促进各级分枝均衡生长。

(3) 对于发枝力弱、生长较慢的植物，如木槿、紫薇、碧桃、鸡爪槭等，冬季宜轻剪，以短截为主，疏剪为辅，可对壮枝进行短截促进分枝。

地被及草本花卉的修剪

当植株密度过大时，适当疏除部分植株。对于冬季枯萎的宿根花卉和观赏草类，剪去地上枯萎部分。对于球根类植物，开花地上部分枯萎后，可剪去地上部分，需要掘球的要将种球挖出。

注意事项：

凡是在春季开花的花木，如梅花、山茶、樱花、碧桃、迎春、丁香、海棠、紫荆等，花芽都是在前一年生的枝条上形成的，冬季不能重剪。

凡是在当年生枝条上开花的花木，如木槿、紫薇、木芙蓉、扶桑、茉莉、绣球花、一品红、夜来香等，应在冬季重剪，促其翌年多萌发新梢、多开花、多结果。

冬季果实宿存不落，在冬季不宜重剪，在第二年早春进行疏剪。

绿化苗木新移植大树，对土壤水分需求量较小，根系吸水功能减弱。因此，只要保持土壤适当湿润即可。土壤含水量过大，反而会影响土壤的透气性能，抑制根系的呼吸，对发根不利，严重的会导致烂根。

在浇水的控制方面注意：

，绿化苗木苗圃基地，要严格控制土壤浇水量。移植时次浇透水，以后应视天气情况、土壤质地，绿化苗木，检查分析，谨慎浇水。同时要慎防喷水时过多水滴进入根系区域。

第二，要防止树池积水。种植时留下的浇水穴，在次浇透水后即应填平或略高于周围地面，以防下雨或浇水时积水。同时，在地势低洼易积水处，要开排水沟，保证雨天能及时排水。

第三，要保持适宜的地下水位高度（一般要求1.5米以下）。在地下水位较高处，要做网沟排水，汛期水位上涨时，可在根系外围挖深井，用水泵将地下水排至场外，绿化苗木批发，严防淹根。

2、保护新芽：

新芽萌发，是新植大树进行生理活动的标志，是大树成活的希望。更重要的是，树体地上部分的萌发，对根系具有自然而有效的刺激作用，能促进根系的萌发。

绿化苗木北方养殖牡丹花需要注意

牡丹虽然较耐寒，但在华北等寒冷的地区，立冬前后，应搬入室内，放在房间的向阳处，室温保持0度左右即可。次年出室不宜过早，须待清明前后再出室。不太寒冷的地区，可选隐风处将花盆埋入土壤内，使盆面与地面平齐，以保持盆土的湿度和温度，也可保证牡丹安全越冬。待第二年春天牡丹花现蕾后，再连盆将牡丹从地中挖出，进行正常管理。

2、南方养殖牡丹花要特别注意温度、浇水、光照、施肥等因素。牡丹为深根性落叶灌木花卉，性喜阳光，耐寒，爱凉爽环境而忌高温闷热，适宜于疏松、肥沃、排水良好的砂质土壤中生长。好用深度为60-70厘米的瓦缸。南方天气燥热，夏天高温时要防止牡丹花受到曝晒并及时采取降温措施。有些花友反应种植的牡丹花不开花这里提醒下，如果温度没有把控好，任其受热，落叶，将严重影响以后开花。

2、施肥不当会引起牡丹花叶子发黄现象。多肥或少肥都会引起叶子发黄。新上盆的牡丹切忌施肥，半年之后逐渐服盆后，方可施肥。生长期要经常松土，道路绿化苗木，施肥不可太勤，一年内2—3次即可。肥料以发酵腐熟的鸡粪水或豆饼水为宜，肥水比例为30%即可。施肥应选择晴朗天气，待盆土偏干以后进行。施前停止浇水。同时应加小心，不要将肥液沾溅到枝叶上，若已沾上，应用清水冲涮干净。

绿化苗木苗圃基地-绿化苗木-景致红花继木大杯基地(查看)由南昌景致花园绿化有限公司提供。南昌景致花园绿化有限公司是一家从事“绿化养护，绿化工程，园林设计施工，绿化苗木”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“景致绿化养护，绿化工程，园林设计施工，绿化苗木”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使景致绿化在绿化工程中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！