

# 金森女贞 景致红继木球批发基地 金森女贞工程苗

产品名称	金森女贞 景致红继木球批发基地 金森女贞工程苗
公司名称	南昌景致花园绿化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌经济技术开发区枫林西大街1629号
联系电话	15079122733 15079122733

## 产品详情

### 绿化苗木三角梅根颈腐烂病三角梅染病初期

根颈部皮层出现褐色水浸状病斑，后逐渐腐烂，向内发展可深及木质部，破坏输导组织，导致植株萎蔫、顶芽不发、病株根系变褐、发育不良、须根少且短，叶片脱落，部分枝条或整个植株呈黑色光杆状枯死。

发病的直接原因是土壤中有病菌存在：一是栽培基质未消毒被反复利用，基质滋生了大量病原菌，为植株发病提供了侵染源；二是园林建筑垃圾土带菌，未被充分消毒后就直接栽种。

发病的间接原因是环境条件影响：一是栽培土壤黏重，透气性差，易积水板结，病害；二是移栽时根颈部的机械伤口，为病菌侵入创造了有利条件；三是高湿导致植株发病，金森女贞工程苗，浇水过频、过量造成湿度增加，有利于植株发病，浇水方式不当（大水冲浇）有助于水的飞溅作用和水流传播。

栽种前，先对栽种土进行杀菌处理，再改良土壤理化性质（若土壤条件差，需适当增加活力源用量）。三角梅移栽前后，尽量减少根颈部损伤，以降低发病几率。发病后，金森女贞规格，用健致800至1000倍液+跟多800至1000倍液浇灌或喷淋，杀菌促根，促进恢复。

三角梅病主要危害叶和嫩枝，被害部位呈水渍状圆形或近圆形暗色小斑，而后逐渐向叶片内扩展，并可占叶面的大部分，有时形成环状病斑。后期病斑中央灰白色，其上有许多小粒点。发病严重的植株，叶片不断脱落。在高温高湿、荫蔽度大、通风不良以及栽培管理差的条件下，易发生和蔓延。

绿化苗木牡丹的富贵与华美，是世人所倾慕的。犹记得小时候邻居家种植了数盆牡丹花苗，因为不了解牡丹花的生长习性，在大冬天将牡丹花全部置于院子外面，金森女贞，而造成全部牡丹花夭折。牡丹花比起、水仙，它更难养些。

盆栽养殖牡丹花建议在9-10月份栽培为好。家庭养殖要特别注意品种的选择，较其它品种来说，洛阳红、胡红等品种的牡丹花更适合用于盆栽养殖，它们对环境的适应能力较强些。牡丹花也可以通过播种进行繁殖，但通过播种养殖的方式，要4-5年才能开花。

牡丹花的花期：4-5月份为牡丹花的花期，管理得当的话，正常花期一般在10至15天左右，当然也有花期比较长的，大叶金森女贞，大概在20天左右!牡丹花的花期会受到气候和温度的影响。牡丹开花时，可设棚覆盖或暂时放在室内，避免阳光直射，这样可延长开花期，对主枝顶芽是叶芽的，应摘去，以免徒长，影响开花。

造成盆栽牡丹花成活率不高的主要原因有：1.温度控制不当。2.施肥不当。3.光照条件。

绿化苗木由于回填的种植土疏松，容易歪斜，倒伏

因此行道树必须设立护树桩保护。护树桩一般以露出地面1.5~1.7m为适宜，必须用木棍支撑大枝条，以稳定树木的原有树姿。其它护树支架用竹子、木桩等，一搬采用三角支撑方法。在高温反季节栽植时，必须做好准备，合理安排程序，务必做到随起挖、随运、随栽植。环环紧扣，尽可能缩短施工时间，栽植后及时淋水，并经常进行叶面喷水。高温强阳时要采取防日灼措施，提高苗木成活率。树木定植后24小时内必须浇水遍水，并且浇透，使泥土充分吸收水分，根系与土紧密结合，以利根系发育。如有缺苗，及时补栽，以便迅速成林绿化。

金森女贞-景致红继木球批发基地-金森女贞工程苗由南昌景致花园绿化有限公司提供。南昌景致花园绿化有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！