

青岛假体隆胸 青岛假体隆胸有哪些副作用 青岛假体隆胸安全吗

产品名称	青岛假体隆胸 青岛假体隆胸有哪些副作用 青岛假体隆胸安全吗
公司名称	青岛金岛医疗美容
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	青岛市市北区延吉路10号
联系电话	0532-83838317 13156275987

产品详情

青岛假体隆胸 青岛假体隆胸有哪些副作用 青岛假体隆胸安全吗

【青岛金岛医疗整形】地址：青岛市市北区延吉路10号金岛医疗整形 联系人：张经理 13156275987 0532-83838317 网址：<http://www.qdmrzx.com> 假体隆胸已经成为了大家所熟知并认可的一种美丽方式了。但是，对于假体隆胸来说，很多人存在着很多顾虑。人们担心在假体隆胸后，会出现这样或是那样的副作用，其实，如果选择正规的医院和医生来为您进行治疗的话，如果医生的水平足够好，很多副作用是可以控制的。所以，如果你想进行假体隆胸的治疗，一定要慎重选择。下面，来说一下，如果操作不当，可能出现的一些副作用。1、感染。最常见的问题。发生在手术后3到5天以内的，主要是创口感染。常常伴有局部的疼痛，触痛，创口愈合后重新裂开，有分泌物。这种情况完全不要惊慌，只要处理恰当，控制感染，良好愈合是没有问题的，而且也不会影响手术效果。这种手术后早期感染，除和受术者身体状况、手术环境有关外，和滥用抗生素也不无关系。目前普遍存在着美容病人手术后滥用抗生素的问题。要么静脉滴注，要么口服，动则头孢类，一用就是几天。一般地讲，整形美容手术是一个无菌手术，一级外科切口，除特殊情况，是可以不用抗生素的。因为滥用抗生素会造成菌群堆失调、耐药增加、免疫力下降，反而容易导致新的非致病菌群的感染。此点应当广泛引起注意。发生在假体隆胸以后的远期感染，并不多见。准确地说，不是假体本身发生了炎症，而是乳腺组织出现了问题。这和没有隆胸的人一样，乳腺组织在某些情况下也可能出现炎症问题。这类情况比较复杂，要请医生检查确诊，决定治疗方法，不可盲目用药，延误病情。2、包膜挛缩 丰胸术后乳房假体周围形成纤维包膜将其包绕，一般情况下，包膜较薄、较软，对假体约束力不大，乳房手感良好；如果由于受某些因素的影响，刺激纤维组织过度增生，包膜变得肥厚，从假体周围向中心收紧（挛缩），使假体紧缩在很小的囊腔中。假体周围纤维包膜的形成不是人体组织对假体的排异反应，而是人体对异物的正常反应。它的发生与个体差异、假体种类、假体植入位置、术后血肿、感染等诸多因素有关。因此，术前选择适合的假体，并将其置于胸大肌下足够大的腔隙中；术中减少出血、防止感染，避免假体渗漏；术后及时定期按摩乳房等都是预防包膜挛缩发生的有效措施。一旦形成则需重新假体植入。3、血肿 乳房假体植入丰胸术，植入的假体是一种组织代用品，剥离的腔隙较大，有可能术后产生血肿，通常在术后4~48小时内发生。小血肿一般没有明显感觉，大都会自行吸收。出血多形成大血肿，受术者就会感觉乳房持续性胀痛或跳痛，乳房局部肿胀、张力增大，皮肤青紫出现淤斑。应记下手术大夫的电话号，及时告诉手术大夫进行处理。回家后如有情况，随时联系。假体丰胸术血肿发生率约1%~3%。4、隆胸假体破裂。大都是假体本身的原因。早年的某些假体，因其包膜囊质量的关系，可能出现老化，渗漏，破裂，这是最常见的。暴力的原因造成假体突然破裂是罕见的。出现假体破裂要及时进行假体置换。但困难的是，假体的老化慢性渗

漏，隆胸者本人往往不易发现，要请医生帮助确定。5、隆胸假体移位游走。这种情况往往发生在做腋下切口的病人。出现假体移位游走，一般通过手术可以很好解决。