

斜纹夜蛾防治 山东有机化工厂

产品名称	斜纹夜蛾防治 山东有机化工厂
公司名称	山东省成武县有机化工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区
联系电话	15305405686 15305405686

产品详情

瓜蓟马又称棕榈蓟马、棕黄蓟马，主要危害节瓜、冬瓜、西瓜、苦瓜、番茄、茄子及豆类蔬菜。成虫、若虫以锉吸式口器取食心叶、嫩芽、花器和幼果汁液，嫩叶嫩梢受害，组织变硬缩小，茸毛变灰褐或黑褐色，斜纹夜蛾防治时间，植株生长缓慢，节间缩短，幼瓜受害，果实硬化，瓜毛变黑，造成落瓜。瓜蓟马在广西一年发生17~18代，世代重叠，终年繁殖，3~10月为害瓜类和茄子，冬季取食马铃薯等作物，每年有3个为害高峰期，即5月下旬至6月中旬，7月中旬至8月上旬以及9月，尤以秋季发生普遍，为害严重。瓜蓟马成虫活跃、善飞、怕光，多在节瓜嫩梢或幼瓜的毛丛中取食，少数在叶背为害。雌成虫主要行孤雌生殖，也偶有生殖；卵散产于叶肉组织内，每雌产卵22~35粒，若虫也怕光，到3龄末期停止取食，坠落在表土。

蓟马一年四季均有发生，春、夏、秋三季主要发生在露地，冬季主要在温室大棚中，危害茄子、黄瓜、芸豆、辣椒、西瓜等作物。发生高峰期在秋季或入冬的11~12月份，3~5月份则是第二个高峰期。雌成虫主要进行孤雌生殖，偶有生殖，极难见到雄虫。卵散产于叶肉组织内，每雌产卵22~35粒。雌成虫寿命8~10天。卵期在5~6月份为6~7天。若虫在叶背取食到高龄末期停止取食，落入表土化蛹。该科昆虫广泛分布在世界各地，食性复杂，主要有植食性、菌食性和捕食性，其中植食性占一半以上，是主要的经济害虫之一。它们常以锉吸式口器锉破植物的表皮组织吮吸其汁液，引起植株萎蔫，造成籽粒干瘪，影响产量和品质 [2]。蓟马喜欢温暖、干旱的天气，其适温为23~28℃，适宜空气湿度为40%~70%；湿度过大不能存活，当湿度达到100%，温度达31℃时，若虫全部死亡。在雨季，如遇连阴多雨，葱的叶腋间积水，能导致若虫。大雨后或浇水后致使土壤板结，使若虫不能入土化蛹和蛹不能孵化成虫。蓟马是昆虫纲缨翅目的统称。幼虫呈白色、黄色、或橘色，成虫黄色、棕色或黑色；取食植物汁液或真菌。体微小，体长0.5-2mm，很少超过7mm。蓟马科Thripidae隶属于缨翅目Thysanoptera蓟马总科Thripidae，全世界已知276属2000余种，包括针蓟马亚科Panchaethripinae、棍蓟马亚科Dendrothripinae、绢蓟马亚科Sericothripinae和蓟马亚Thripinae 4个亚科。该科昆虫广泛分布在世界各地，食性复杂，主要有植食性、菌食性和捕食性，其中植食性占一半以上，是重要的经济害虫之一。斜纹夜蛾防治-山东有机化工厂(在线咨询)由山东省成武县有机化工厂提供。山东省成武县有机化工厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！