

北方根结线虫对萝卜的危害 山东有机化工厂

产品名称	北方根结线虫对萝卜的危害 山东有机化工厂
公司名称	山东省成武县有机化工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区
联系电话	15305405686 15305405686

产品详情

胡萝卜根结线虫发病规律首先，我们简单讲解一下胡萝卜根结线虫的发病规律！胡萝卜根结线虫主要以卵的形式在土壤或者土壤下作物残存根茎中越冬，第二年温度达到10摄氏度时就开始孵化产生危害，当温度达到27摄氏度左右，危害为严重，尤其是秋季种植的胡萝卜，容易发生根结线虫危害！当温度低于5时，根结线虫活动能力大大下降，危害降低！胡萝卜根结线虫对胡萝卜的危害表现在两个方面，苗期直接刺穿根系，造成根系分叉，侧根增多，严重的直接；后期胡萝卜果实出现畸形果，南方根结线虫对白菜的危害，果实表面粗糙，严重影响果实品质！

茄子根结线虫病是由南方根结线虫、爪哇根结线虫等引起的、发生在茄子的病害。主要为害茄子根部，尤以支根受害多。根上形成很多近球形瘤状物，似念珠状相互连接，初表面白色，后变褐色或黑色，地上部表现萎缩或黄化，天气干燥时易萎缩或枯萎。 [2] 茄子根结线虫病是茄子生产中常见病害之一。该病可导致茄子植株矮小，影响茄子正常生长。发病地块可减产20%左右，发病严重的地块减产达50%以上，可给茄子种植户带来巨大经济损失。 [1] 茄子根结线虫病的防治方法主要有加强检疫；选用无病土育苗，或苗床用药剂处理；与葱、蒜等非茄科作物进行2-3年的轮作；加强田间管理，合理密植，合理灌溉，及时清除病蔓、病叶、病株。此外，在该病为害严重的地区，还可采用嫁接的方法防治茄子根结线虫病

水稻根结线虫病的危害症状

危害须根根尖，形成根结，严重时地上部矮化，发黄。病苗叶色变淡、纤弱，分蘖期根瘤数量大增，症状更显著，植株矮小，根短、叶片均匀黄化，茎秆纤细，分蘖力减弱。

根结线虫病危害会让水稻减产10%左右，严重发生的田块可减产50%左右，农民受创度比较大。该虫一般寄生于水稻和陆稻上。 根部：水稻根尖初病时扭曲变粗，会逐渐膨大，形成根瘤。根瘤初卵圆形，白色，后发展为长椭圆形，两端稍尖，色棕黄至棕褐以至黑色。 穗部：抽穗期病株矮小，叶黄，穗期短、少，出穗比较困难，发病重的不能抽穗。结实期果实比较少，结实率低。 全株：由于根结线虫病的影响，水稻地上部发生近似缺肥症状，病苗纤细，叶色变淡，病株矮小，根短，叶片均匀发黄。

北方根结线虫对萝卜的危害-

山东有机化工厂(在线咨询)由山东省成武县有机化工厂提供。山东省成武县有机化工厂是山东 济南 ,杀菌剂的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在山东有机化工厂领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创山东有机化工厂更加美好的未来。