

# 原装进口雅培安素-肠内营养粉TP

产品名称	原装进口雅培安素-肠内营养粉TP
公司名称	厦门市湖里区福琪医疗器械经营部
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市湖里区仙岳路2019号
联系电话	86-05928269653 13950192423

## 产品详情

联系电话:18695672867 QQ :82374494 肠内营养粉剂(TP) ( Enteral Nutritional Powder(TP) ) , 商品名安素。安素粉剂可作为唯一营养来源或部分营养补充, 适用于成人及四岁或四岁以上儿童, 可口服或管饲。本品可提供高质量营养, 能增强营养、造血及免疫功能。用于消化道瘘或昏迷者管饲, 接受化疗、放疗的肿瘤患者等是一种完整的蛋白营养制剂, 适用于肠道功能消化吸收好的患者。副作用  
没有肠内营养禁忌症的人正确服用时一般不会出现副作用。服用注意事项 安素粉剂的正确冲调对于防止插管堵塞和保证全部的营养转运是重要的, 安素粉剂不能胃肠外注射或静脉内使用。  
孕妇及哺乳期妇女用药 无特殊要求, 应根据营养需求调整用量, 详见【用法用量】 儿童用药  
4岁以下儿童不宜服用本品 老年患者用药 无特殊要求, 应根据营养需求调整用量, 详见【用法用量】  
用法用量 营养补充: 本品作为口服补充营养时, 建议每次250ml, 每日三次。安素粉剂可作唯一营养来源或营养补充, 打开容器后注意防腐以避免污染, 安素粉剂在室温下或冷却后服用。禁止安素( Ensure ) 粉剂胃肠外注射或静脉内使用。管饲 在医生的指导下服用。根据患者的条件和耐受量调整流速, 体积和稀释量。额外需要的液体应通过每餐和两餐之间的给水来满足, 在服用时通过常规的管饲给予, 也可通过治疗前后给水来补足所需水分。连续管饲时, 胃内的残留物应每2或4小时检查一次; 间歇管饲时, 在每次管饲前检查一次。如果患者表现出不能忍受( 比如恶心, 腹部绞痛, 腹胀或腹泻), 给药速度应减至25ml/h, 接着再缓慢地增加至正常速度。此时患者应全浓度供给。速度和浓度不宜同时改变。如果患者仍不能忍受可将配方稀释。在连续进食时每3到6小时或每次间歇进食后, 用水( 如25至100ml ) 清洗管道, 预防管道堵塞并且提供额外的水分。口服 [通用名]: 肠内营养粉剂(TP)  
[拼音名]: changneiyinyangfenji(TP) [英文名]: Enteral Nutritional Powder(TP)  
[主要成分]: 蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质  
[药品性状]: 本品为淡黄色粉末, 气芳香、味甜。[功能主治]: 安素粉剂可作为唯一营养来源或部分营养补充, 适用于成人及四岁或四岁以上儿童, 可口服或管饲。[使用方法]: 安素粉剂可作唯一营养来源或营养补充, 打开容器后注意防腐以避免污染, 安素粉剂在室温下或冷却后服用。禁止安素( Ensure ) 粉剂胃肠外注射或静脉内使用。[药代动力学]: 尚无相关报告。  
[不良反应]: 没有肠内营养禁忌症的人正确服用时一般不会出现副作用。  
[药物相互作用]: 尚无相关报告 [药理毒理]: 尚无相关报  
[孕妇及哺乳期妇女用药]: 无特殊要求, 应根据营养需求调整用量。  
[儿童用药]: 4岁以下儿童不宜服用本品。 [老年患者用药]: 无特殊要求, 应根据营养需求调整用量。 [注意事项]: 安素粉剂的正确冲调对于防止插管堵塞和保证全部的营养转运是重要的, 安素粉剂不能胃肠外注射或静脉内使用。 [贮藏方法]: 冲调好的安素应该立即服用或加盖冰箱保存, 在24小时内服完, 开盖的罐

子应该用盖子盖住,贮藏,一旦打开,安素粉剂应该在3星期内用完。  
[有效期]：本品有效期为36个月，请在罐底的截止日期前使用。