

噻吩磺隆Thifensulfuron-Methyl

产品名称	噻吩磺隆Thifensulfuron-Methyl
公司名称	江苏瑞东农药有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	类别:其他 成分:75% 剂型:颗粒剂
公司地址	常州市金坛区良常东路12号
联系电话	0519-82302386

产品详情

类别	其他	成分	75%
剂型	颗粒剂	有效成分含量	95%TC,15%,25%WP,75%WG,75? (%)
水分含量	3.0 (%)	酸度	7 (%)
允许残留量	/(mg/kg)	用途	大豆田除草
生产厂家	江苏瑞东农药有限公司	CAS	/
品牌	ruidong		

特点 是一种高效选择性芽后茎叶处理剂，能用于禾谷类作物防除1年生阔叶杂草。主要通过杂草叶面和根系吸收并传导。一般施药后，敏感杂草立即停止生长，1周后死亡。适用范围适用于小麦、大麦、燕麦等禾谷类作物防除反枝苋、马齿苋、臭甘菊、春蓼、藜等1年生阔叶杂草。

特点 是一种高效选择性芽后茎叶处理剂，能用于禾谷类作物防除1年生阔叶杂草。主要通过杂草叶面和根系吸收并传导。一般施药后，敏感杂草立即停止生长，1周后死亡。适用范围适用于小麦、大麦、燕麦等禾谷类作物防除反枝苋、马齿苋、臭甘菊、春蓼、藜等1年生阔叶杂草。

特点 是一种高效选择性芽后茎叶处理剂，能用于禾谷类作物防除1年生阔叶杂草。主要通过杂草叶面和根系吸收并传导。一般施药后，敏感杂草立即停止生长，1周后死亡。适用范围适用于小麦、大麦、燕麦等禾谷类作物防除反枝苋、马齿苋、臭甘菊、春蓼、藜等1年生阔叶杂草。

特点 是一种高效选择性芽后茎叶处理剂，能用于禾谷类作物防除1年生阔叶杂草。主要通过杂草叶面和根系吸收并传导。一般施药后，敏感杂草立即停止生长，1周后死亡。适用范围适用于小麦、大麦、燕麦等禾谷类作物防除反枝苋、马齿苋、臭甘菊、春蓼、藜等1年生阔叶杂草。95%tc,15%,25%wp,75%wg,75%w

特点 是一种高效选择性芽后茎叶处理剂，能用于禾谷类作物防除1年生阔叶杂草。主要通过杂草叶面和

根系吸收并传导。一般施药后，敏感杂草立即停止生长，1周后死亡。适用范围
适用于小麦、大麦、燕麦等禾谷类作物防除反枝苋、马齿苋、臭甘菊、春蓼、藜等1年生阔叶杂草。