

连山壮族瑶族自治县国家公园生态环境监测

产品名称	连山壮族瑶族自治县国家公园生态环境监测
公司名称	广州澳盾智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区思成路35号03栋B座8层
联系电话	18922128751

产品详情

斑尾榛鸡（学名：Bonasa sewerzowi）为中国特有品种，只产于中国甘肃、青海、四川等地。主要以柳、榛的鳞芽、叶和云杉种子以及其他植物的花、花序、叶、嫩枝梢为食。亦捕食小毛虫、伪步行虫、金花虫等。分布区狭窄，加上人为和天敌的破坏，数量日少，处于濒危状态。

野外鉴别特征：中型鸟类，体长31~38厘米，大小和榛鸡相似。上体栗色，具显著的黑色横斑；颈、喉黑色，周边围有白边；胸栗色，向后近白色；各羽均具黑色横斑，外侧尾羽黑褐色，具若干白色横斑和端斑。

相似种花尾榛鸡外形、大小与斑尾榛鸡均很相似，野外难以分辨。但二者分布区域不同；另外，花尾榛鸡腹栗白色而具黑色圆弧形斑点，外侧尾羽灰褐色而杂有黑褐色虫蠹斑，国家公园生态环境监测，斑尾榛鸡腹栗褐色而具黑色横斑，外侧尾羽黑褐色而具狭形白色横斑，外部形态也不相同。

西藏盘羊（学名：Ovis hodgsoni）：是牛科、盘羊属动物。通体大部分为棕色，春季时臀部较躯干颜色淡。尾巴很小，约2.5-5.8厘米。后腿和前腿的毛发明显分为浅色和深色两部分，胸部到蹄部通常有一条深色条纹。西藏盘羊雄性的弯角粗大，可长达1米以上，向下扭曲呈螺旋状，外侧有环棱，不形成完整的圆形；雌性的角非常短，而且弯度不大。

是典型的山地动物，喜欢在半开旷的高山裸岩带及起伏的山间丘陵生活。分布海拔在2500米至5000米的高寒草原、高寒荒漠、高寒草甸等环境中，夏季常活动于雪线的下缘，当冬季栖息环境积雪深厚时，它们则从高处迁至海拔较低的山谷地带生活。主要在晨昏活动，冬季也会在白天觅食。主要以禾本科、葱属以及杂草为食。分布于尼泊尔、印度和中国青藏高原地区。

白颈长尾雉（学名：Syrnaticus ellioti）：大型鸡类，体长81厘米，体型大小和雉鸡相似。雄鸟头灰褐色，颈白色，脸鲜红色，其上后缘有一显著白纹，上背、胸和两翅栗色，上背和翅上均具1条宽阔的白色带，极为醒目；下背和腰黑色而具白斑；腹白色，尾灰色而具宽阔栗斑。雌鸟体羽大都棕褐色，上

体满杂以黑，背具白色矢状斑；喉和前颈黑色，腹棕白色，外侧尾羽大都栗色。

杂食性。主要以植物叶、茎、芽、花、果实、种子和农作物等植物性食物为食，也吃昆虫等动物性食物。该雉分布于北纬25-31°之间，为典型的东洋界华中区东部丘陵平原亚区种类。

连山壮族瑶族自治县国家公园生态环境监测由广州澳盾智能科技有限公司提供。广州澳盾智能科技有限公司是广东广州,安全防护产品项目合作的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在澳盾领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创澳盾更加美好的未来。