

病猪四肢关节肿胀1呼吸困难，厌食1不吃咳喘不断1腹式呼吸跛行

产品名称	病猪四肢关节肿胀1呼吸困难，厌食1不吃咳喘不断1腹式呼吸跛行
公司名称	河南省惠农生物科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州郑州市北环路6号经三名筑5号楼11楼
联系电话	0371-60122005 18638146813

产品详情

病猪四肢关节肿胀1呼吸困难，厌食1不吃咳喘不断1腹式呼吸跛行。。。副猪嗜血杆菌病是由嗜血杆菌引起的多发性浆膜炎和关节炎的细菌性传染病。病菌对外界环境抵抗力不强，干燥环境易死亡。而圆环病毒是引起育肥猪生长发育不良，呈渐进性消瘦的一种传染病。我们必须提醒养殖户加强饲养管理，综合性地提高猪体的抵抗力。今年的呼吸道疾病来得更早一些;如果按照以前的形式去保健，不正确的用药方式导致猪的耐药性，疾病容易反弹、作用时间短;封圈的形式下，为了不使圈舍降温，大大减少了消毒的次数，给一些病原造就了有利的发病条件，所以熏蒸消毒不可缺少。一、症状：1、急性病：体温升高，猪发热40.5-42度，精神沉郁，食欲下降、厌食或废绝，呼吸困难，腹式呼吸，皮肤发红或苍白，耳根肿大，耳尖发紫，眼睑皮下水肿，行走缓慢或不愿站立，跗关节、腕关节、正关节下部肿胀，咳喘，四肢关节肿痛，个别猪跛行，逐渐消瘦，打退烧针后，呈低温状态，全身发紫，共济失调，畏寒扎堆，被毛粗乱，拉黄色稀便衰竭死亡，出现震颤等神经症状，反应迟钝，死前侧卧或四肢呈划水样，有时会无明显症状突然死亡。（可影响从2周龄到4周龄的青年猪，主要在断奶前后和保育阶段发病，通常用于5-8周龄的仔猪，发病率一般在10%-15%，严重死亡率可达50%）2、慢性病：食欲下降，咳嗽，呼吸困难，被毛粗乱，四肢无力或跛行，喘气，疼痛（由尖叫推知），颤抖，走路摇摆，可视黏膜发绀，侧卧，生长不良，直到衰竭死亡。（多见于育肥猪）3、母猪发病可流产，公猪有跛行。哺乳母猪的跛行可能导致母性的极端弱化，死亡时体表发紫，肚子大。二、传播方式：该病通过呼吸系统传播，当猪群中存在繁殖呼吸综合征、流感或地方性肺炎的情况下，该病更容易发生。环境差，断水等情况下该病更容易发生，饲养环境不良时本病多发。断奶、转群、混群或运输等产生应激也是常见原因。三、继发感染：主要病原混合感染，尤其是地方性猪肺炎。只在与其它病毒或细菌协同时才引发疾病。这都与“支原体肺炎、病毒性肺炎”有关。这些病毒主要有“猪繁殖与呼吸综合症、圆环病毒、猪流感和猪呼吸道冠状病毒”。四、防治方案：1、隔离2、彻底清理猪舍卫生，消毒早晚各一次，连用4天，10天可恢复。3、以后每月用猪场十六能强效嗜血康拌料一周，解密长期添加，促进免疫。五、盛世治疗方法：1、育肥猪：速治注射液0.2ml/kg，肌肉注射，每天1次，连用7天。2、发烧的猪：速可安0.2ml/kg，肌肉注射，饲料中加“超抗110”或“严刹”，再配合“猪场十六能”，连用10天，注射时一定要保证“一猪一针头”，防止交叉感染。3、消毒剂：用0.2%-0.5%多效卫士（或0.1%超净），坚持1天消毒一次。4、母猪：猪场十六能强效嗜血康氟西素拌料，连用一周。5、所有小猪：用口蹄皮炎一喷停四肢蹄部消炎杀菌，止肿止痛。

如想了解更多信息，请直接联系，希望能够帮到您！电话：18638146813 在线QQ：1934047651

联系人：小马 地址：郑州市北环路6号