

甘肃陇西福星镇马铃薯种植基地马铃薯冀张薯8号

产品名称	甘肃陇西福星镇马铃薯种植基地马铃薯冀张薯8号
公司名称	陇西县弘泰马铃薯购销专业合作社
价格	2.00/公斤
规格参数	
公司地址	甘肃省定西市陇西县福星镇农贸市场
联系电话	13993274367

产品详情

陇西县弘泰马铃薯购销专业合作社是甘肃省农民专业合作社示范社，在广大种植户和经销商的及消费者的信赖与支持下获得长足发展，产品及种子畅销全国各地。

马铃薯—冀张薯8号

特征特性：

中晚熟品种，生育期99天，株型直立，生长势强，株高73.6厘米左右。茎、叶绿色，单株主茎数2.9个。花冠白色，花期长，天然结实性中等。块茎椭圆形，淡黄皮，乳白肉，芽眼浅，薯皮光滑。结薯集中，单株平均结薯数4.3块，平均单薯重102克。大中薯率83.96%。高抗pvx和pvy，轻度至中度感晚疫病。还原糖含量为0.28%，粗蛋白质含量2.25%，淀粉含量14.8%，干物质含量23.2%，每100克鲜薯含维生素c16.4毫克；蒸食品质优。

产量表现：

2004—2005年参加国家马铃薯品种区域试验，2004年平均产量1775千克/亩，比对照紫花白增产40.9%；2005年平均产量2094千克/亩，比对照紫花白增产37.0%；两年平均产量1935千克/亩，比对照紫花白增产38.8%。2005年生产试验平均产量1388千克/亩，比对照紫花白增产21.5%。

栽培要点：

(1) 种薯处理：选择种薯级别一致的基础种薯的壮龄块茎规格50~120克之间块茎，于4月中旬种薯出窖，出窖后认真分选，选好的种薯平铺10厘米一层置于18~20℃暖室催芽暗光处理12天，待芽基催至0.5~0.7厘米时，转到室外背风向阳处，下铺一层草末，阳光直射处理8天，边晒种边随时翻倒，使其感光均匀一致，翻倒要仔细，不得碰掉芽基，结合翻倒拣出病症薯和不规则块茎。

(2) 切种：50克小薯稍削顶端，小整薯直播，50克以上块茎切种，切种的刀具要用高锰酸钾消毒，种薯要纵切，每块母薯带1~2个芽，切块重30~35克，不得切成条状和片状。

(3) 切种后处理：切块后的种薯按100千克用4千克草木灰、200克甲霜灵、5克块茎膨大素、加水3.5千克进行拌种，然后平铺闲房地表10厘米厚，不得积堆，不得装袋，防止高温受热沾化伤口，杂菌感染刀伤口，24小时后即可播种。

(4) 播种：选择水肥条件高的地块种植，4月底至5月初播种，10厘米地温稳定在5℃为适宜播种期。播种密度3500~4000株/亩，施足底肥。

(5) 田间管理：幼苗50%顶土闷锄1次，中耕深度1.5~2厘米，苗高25厘米用铁锹将垄沟沃土培入垄脊，刨净苗间垄内杂草，培土厚度3.5厘米，压住第一层匍匐茎条，进入现蕾期结合浇水亩追施尿素20千克，3~4天后第二次培土，培土厚度3.5厘米，压严第二层匍匐茎条，两次培土垄脊高度距地表27厘米高，分层培土，分层结薯，增加产量。

(6) 病虫害防治：蚜虫、斑蟊、二十八星瓢虫、草地螟用40%乐果乳油或一遍净对水600倍连续喷洒2次，斑蟊用斑蟊素或敌克杀进行喷洒，辅助人工围歼，从7月10日至8月30日，每隔7天喷洒甲霜灵、雷米多尔、代森锰锌、疫克各1次，防治马铃薯晚疫病危害。

(7) 去杂去劣：进入盛花期，按品种特征特性描述，两次进入田间拔除混杂植株异症株及感病植株，包括地下块茎整体挖出后装入塑料袋作饲料用，不得随意乱扔。

(8) 收获：枯霜后10天收获，继续增加块茎内的淀粉积累，待匍匐茎干缩与块茎脱离，块茎表面光滑不粘泥巴即可收获，采用人工挖掘，犁翻和机械收获，无论采用哪种方法，都要做到轻拿、轻放、轻装、装卸，不得破坏薯皮，确保薯形的完整。

适宜区域：适宜在河北北部、山西北部、内蒙古全部及西北地区及东北一作区种植。

由于马铃薯—冀张薯8号品质地道、营养丰富，深受消费者青睐。我合作社常年供应大量马铃薯—冀张薯8号（商品及种子），欢迎全国各地消费者和经销商洽谈订购！