

一公分树状月季

产品名称	一公分树状月季
公司名称	南阳市卧龙区山林月季种植专业合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区蒲山镇姚亮村七组
联系电话	13838785333

产品详情

一、土质要求：土壤是土质疏松的微酸性土质（PH值6.5左右）为佳，碱性大的土质，可用处理，栽植前施足基肥（有机肥、无机肥均可），以园土30%、塘泥30%、腐植质土30%、细煤渣10%混合使用，栽植盆底层施少许细饼肥。

二、浇水：期要消耗大量的水分和体内营养，一公分树状月季，水分供应要充足，要做到旱干浇透、湿排。浇水因季节而异，春季一般少雨多风，月季苗入土后先生根后发芽，根部生长的生理活动需要充足的氧气和适量的水分，发芽生长则需要充足的水分和适量的氧气，因此，月季苗下地后要浇足水，浇后松土，以后要掌握土壤的干湿、苗木的大小及雨水的多寡浇水；夏季高温时，烈日暴晒，土壤温度太高，水的蒸发量加大，植物处于虚弱半休眠状态，忌干燥脱水，浇水应在下午5点钟以后（土壤骤然降温影响苗木生长）；秋季降雨量大，注意排水。冬天休眠期一定要少浇水，保持半湿即可，露天栽培越冬，在冬眠初合理修剪追肥后，水浇足即可，始终注意保持良好的排水、通风、保水、保肥性能。浇水时不要将水溅在叶上，防止病害。

虫害：

蚜虫：主要为月季管蚜、桃蚜等，它们刺吸植株幼嫩的汁液，危害嫩茎、幼叶、花蕾等，严重影响到植株的生长和开花。处理方法：及时用吡虫啉喷杀；轻度的可用烟蒂浸水或加水稀释后喷杀。

红蜘蛛：主要发生在炎热干旱时期，发生在叶子的背面，吸取植物叶片上的汁液，生长繁殖较快。初期表现为叶片带灰白点，严重时能把叶子的背面甚至叶面全部网状布满，至使植株呈现病态。可用阿维菌素、三氯杀螨醇连续喷施2-3次即可。

介壳虫：主要有白轮蚧、日本龟腊蚧、红腊蚧等，其危害特点是刺吸月季嫩茎、幼叶的汁液，导致植株生长不良，主要是高温高湿、通风不良、光线欠佳所诱发。处理方法：用扑虱灵或介必治喷杀。

刺蛾：主要为黄刺蛾、褐边绿刺蛾的幼虫，于高温季节大量啃食叶片。处理方法：用或氯氢菊酯乳油喷杀。

修剪月季也是有讲究的。

首先需要剪掉弱枝，找到从上往下数第三片向外的叶子，然后把它剪掉；强壮的枝叶后剪，剪粗枝下手一定要狠，修剪的枝条不要超过总枝条长的1/2。不然的话下方的枝条发芽缓慢，影响美感。

枝条上的花苞也不是越多越好，弱枝上留一个花苞，强枝上留两个。单独的枝条上不要超过3个花苞为好，植物开花需要消耗大量的养分，花苞太多，植物无法提供足够的养分，如果花苞过多也需要修剪掉。

月季修剪的切口呈45度倾斜，切口平整，涂抹上草木灰或者3%的硫酸铜溶液，进行消毒，避免病菌

一公分树状月季由南阳市卧龙区山林月季种植合作社提供。南阳市卧龙区山林月季种植合作社实力不俗，信誉可靠，在河南南阳的花木等行业积累了大批忠诚的客户。山林月季带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事盆景月季，南阳盆景月季，河南盆景月季的厂家，欢迎来电咨询。