

紫荆 紫荆花 红花紫荆 紫荆小苗 紫荆树苗 丛生紫荆 风景树苗

产品名称	紫荆 紫荆花 红花紫荆 紫荆小苗 紫荆树苗 丛生紫荆 风景树苗
公司名称	沭阳县华飞花木场
价格	5.00/棵
规格参数	品种:紫荆/满条红 落叶与否:落叶性 株高:0.3-20 (m)
公司地址	沭阳县颜集镇沙愚村龙北组
联系电话	18951522955

产品详情

紫荆又叫满条红、苏芳花、紫株、乌桑、箩筐树。为豆科紫荆属落叶灌木或小乔木，是春季的主要观赏花卉之一，喜阳光，耐暑热。树干挺直丛生，早春季节先于叶开花，花形似蝶，盛开时花朵繁多，成团簇状，紧贴枝干，满树都是花，不仅枝条上能着花，而且老干上也能开花，给人以繁花似锦的感觉；到了夏秋季节则绿叶婆娑，满目苍翠；冬季落叶后则枝干筋骨毕露，苍劲虬曲之感跃然眼前，是观花、叶、干俱佳的园林花木，适合栽种于庭院、公园、广场、草坪、街头游园、道路绿化带等处，也可盆栽观赏或制作盆景。

紫荆花朵漂亮，花量大，花色鲜艳，是春季重要的观赏灌木。较好的适应范围，移栽成活率好，价格低廉，绿化效果，深受各地的欢迎。[9]

紫荆是在2年生以上的老枝上开花，故不可疏剪老枝。3年生以上植株越冬可不再壅土防寒，但应充分冬灌，以防根系损伤。

紫荆树苗移栽在落叶后或萌芽前进行，根系发达的可直接栽植，根系不多的可先假植，翌年定植。大苗需带土球，由于根系发达，不易截断，移栽时可用利刀割断，以免撕裂根皮。移栽时地上部适当修剪整形，丛栽植株每年萌发前应更新部分老枝。生长期施肥2~3次。

紫荆的繁殖常用播种、分株、压条、扦插的方法，对于加拿大红叶紫荆等优良品种，还可用嫁接的方法繁殖。

播种

9月至10月收集成熟荚果，取出种子，埋于干沙中置阴凉处越冬。3月下旬到4月上旬播种，播前进行种子处理，这样才做到苗齐苗壮。用60℃温水浸泡种子，水凉后继续泡3~5天。每天需要换凉水一次，种子吸水膨胀后，放在15℃环境中催芽，每天用温水淋浇1~2次，待露白后播于苗床，2周可齐苗，出苗后适

当间苗。4片真叶时可移植苗圃中，畦地以疏松肥沃的壤土为好。为便于管理，栽植实行宽窄行，宽行60厘米，窄行40厘米，株距30厘米至40厘米。幼苗期不耐寒，冬季需用塑料拱棚保护越冬。[7]

分株

紫荆根部易产生根蘖。秋季10月份或春季发芽前用利刀断蘖苗和母株连接的侧根另植，容易成活。秋季分株的应假植保护越冬，春季3月定植。一般第二年可开花。

压条

生长季节都可进行，以春季3~4月较好。空中压条法可选1~2年生枝条，用利刀刻伤并环剥树皮1.5厘米左右，露出木质部，将生根粉液（按说明稀释）涂在刻伤部位上方3厘米左右，待干后用筒状塑料袋套在刻伤处，装满疏松园土，浇水后两头扎紧即可。一月后检查，如土过干可补水保湿，生根后剪下另植。灌丛型树可选外围较细软、1~2年生枝条将基部刻伤，涂以生根粉液，急弯后埋入土中，上压砖石固定，顶梢可用棍支撑扶正。一般第二年3月分割另植。有些枝条当年不生根，可继续埋压，第二年可生根。

扦插

紫荆花

在夏季的生长季节进行，剪去当年生的嫩枝做插穗，插于沙土中也可成活，但生产中不常用。

嫁接

可用长势强健的普通紫荆、巨紫荆做砧木，但由于巨紫荆的耐寒性不强，故北方地区不宜使用。以加拿大红叶紫荆等优良品种的芽或枝做接穗，接穗要求品种纯正、长势旺盛，选择无病虫害或少病虫害的植株向阳面外围的充实枝条，接穗采集后剪除叶片，及时嫁接。可在4~5月和8~9月用枝接的方法，7月用芽接的方法进行。如果天气干旱，嫁接前1~2天应灌一次透水，以提高嫁接成活率。

在紫荆嫁接后3周左右应检查接穗是否成活，若不成活应及时进行补接。嫁接成活的植株要及时抹去砧木上萌发的枝芽，以免与接穗争夺养分，影响其正常生长。

紫荆原产于中国，在湖北西部、辽宁南部、河北、陕西、河南、甘肃、广东、云南、四川等省都有分布。性喜欢光照，有一定的耐寒性。喜肥沃、排水良好的土壤，不耐淹。萌蘖性强，耐修剪。

性喜欢光照，有一定的耐寒性。喜肥沃、排水良好的土壤，不耐淹。萌蘖性强，耐修剪。[3]野生的多为落叶乔木，高可达15米左右，今在陕西太行山下和湖北神农架林区，还可以看到紫荆乔木的丰姿。而栽培于庭院中的紫荆，则多为丛生落叶灌木。叶微阔，春季开花，先花后叶，一簇数朵，花冠如蝶。最奇特处是其开路无固定部位，上至顶端，下至根枝，甚至在苍老的树干上也能开花，因而又有“满条红”的美称。花除紫色外，还有一种较为罕见、观赏价值极高的白花紫荆。

香港紫荆与大陆其它地区生长的紫荆不同，只能在热带和亚热带生长，目前只有在广东、福建、台湾、广西、海南、云南等地生长。

豆科紫荆属。该属为落叶乔木或灌木。单叶互生，叶卵圆形，叶顶短渐尖，基部心形，全缘，叶脉掌状，有叶柄，托叶小，早落。花于老干上簇生或成总状花序，先于叶或和叶同时开放；花萼阔钟状；5齿裂，弯齿顶端钝或圆形；花两侧对称，上面3片花瓣较小；雄蕊10，分离；子房有柄。荚果扁平，狭长椭圆形，沿腹缝线处有狭翅；种子扁，数颗。紫荆为落叶乔木，经栽培后常成灌木状。叶互生，近心形，顶端急尖，基部心形，长6~14厘米，宽5~14厘米，两面无毛。花先于叶开放，4~10朵簇生于老枝上；小苞片2，阔卵形；花玫瑰红色，长1.5~1.3厘米，小花梗纲柔，长0.6~1.5厘米。荚果狭披针形，扁平，长5~14厘米，宽1.3~1.5厘米，沿腹缝线有狭翅不开裂；种子2~8颗，扁圆形，近黑色。花期4~5月。

物种分布

紫荆原产于中国，在湖北西部、辽宁南部、河北、陕西、河南、甘肃、广东、云南、四川等省都有分布。香港紫荆与大陆其它地区生长的紫荆不同，只能在热带和亚热带生长，只有在广东、福建、台湾、广西、海南、云南等地生长。

紫荆，属豆科植物，因“其木似黄荆而色紫，故名。”（《本草纲目》）俗名箩筐树，又叫紫珠。原产我国，分布较广，落叶乔木或灌木。叶圆心形，春开红紫色花。供观赏。树皮、木材、根均可入药。参阅明李时珍《本草纲目·木三·紫荆》。

又叫满条红、苏芳花、紫株、乌桑、箩筐树。为豆科紫荆属落叶灌木或小乔木，是春季的主要观赏花卉之一，喜阳光，耐暑热。树干挺直丛生，早春季节先于叶开花，花形似蝶，盛开时花朵繁多，成团簇状，紧贴枝干，满树都是花，不仅枝条上能着花，而且老干上也能开花，给人以繁花似锦的感觉；到了夏秋季节则绿叶婆娑，满目苍翠；冬季落叶后则枝干筋骨毕露，苍劲虬曲之感跃然眼前，是观花、叶、干俱佳的园林花木，适合栽种于庭院、公园、广场、草坪、街头游园、道路绿化带等处，也可盆栽观赏或制作盆景。[2]

另：香港特别行政区区花洋紫荆，亦名紫荆花，但与本种极不相同。香港区旗区徽上的紫荆花是白色的。白花紫荆十分罕见，因而十分名贵。

"供应紫荆 紫荆花 红花紫荆 紫荆小苗 紫荆树苗 丛生紫荆 风景树苗"的园林用途为行道树,风景树,庭荫树,防护树,篱植物,高度年生长量是20（cm），花色色系为紫色系，品种是紫荆/满条红，主要观赏部位为观花，土球直径是20-40（cm），树龄为1-10（年），花期是4（月），落叶与否为落叶性，冠幅是20-300（cm），主干高为50-150（m），地径是1-5（cm），株高为0.3-20（m），是否移植苗是是，树形为丛生形，是否古树是否，胸径为1-5（cm），栽培环境是露地，胸径年生长量为1（cm）