

50%单氰胺果树破眠剂 芽早 催树醒 荣芽

产品名称	50%单氰胺果树破眠剂 芽早 催树醒 荣芽
公司名称	淄博丽硕化工有限公司
价格	6.20/千克
规格参数	类别:单氰胺 有效成份含量:50(%) 酸度 :30(%)
公司地址	山东省淄博市张店高新区
联系电话	13853380763

产品详情

一、使用方法

- 1、使用剂量作物名称 用药量 施药方式葡萄 20-25倍液
抹芽、喷雾櫻桃 50-60倍液 喷雾油桃、杏 50-60倍
喷雾毛桃、蟠桃 30倍 喷雾猕猴桃 30-40倍 喷雾 对特
定地区、不同品种的使用方法，请参照当地的实际情况。推荐在以上作物上使用，可取得良好的效果，对于其它作物，请谨慎使用或在技术人员的指导下使用。
- 2、施用时间 施用时间主要取决于农业气候、作物以及施用的目的,南方落叶果树（葡萄）一般施用时间在正常发芽前45-50天。北方暖棚作物，如葡萄、大櫻桃、油桃等可在扣棚升温后1-2天内使用。佳施用时间可能每年都不同，建议施用时请教技术人员或根据当地施用经验确定。
- 3、施用方法 将药液配好后，直接用喷雾器喷洒或用刷子或脱脂棉蘸取配制好的溶液，均匀涂抹在芽干上，使用的原则是要求芽芽见药，均匀喷施，不得重复。低压喷涂，至枝条湿透。涂抹：以毛笔或小刷子蘸药液涂抹休眠枝条或蔓。（点芽以湿透芽眼为好。好保留顶端2个芽眼不点以保持它的顶端优势。）
- 二、注意事项
- 1、本品对眼睛和皮肤有刺激作用，直接接触后，会引起过敏,表层细胞层脱去（脱皮）。误饮，会损伤呼吸系统。如发生上述症状，请立即到医院就诊。
 - 2、使用时必须穿防护衣和防护眼罩，注意不要使皮肤直接接触。
 - 3、使用时不能吃东西、喝饮料和吸烟。操作前后24小时内严禁饮酒或食用含酒精的食品。
 - 4、操作后用清水洗眼、漱口，并用肥皂仔细清洗脸、手等易暴露部位，清洗防护用品。
 - 5、芽早能使绿叶枯萎，使用时避免喷洒到相邻正在生长的作物上。
 - 6、在有晚霜的地区，使用时注意晚霜，避免作物过早发芽而受到晚霜危害。
 - 7、芽早对蜜蜂有毒害，不得喷洒到蜜蜂正在采蜜的植物上。
 - 8、不得与其他叶肥、农药混用。
 - 9、施用时请严格施用时期和倍数，由于核果类果树为纯花芽，鳞片的保护能力差，喷药时如果施用浓度不当，可能会出现药害，但甜櫻桃表现较强的抗药性，这可能与外围鳞片对花原基的保护性较强有关。
 - 10、本品要求存储在20度之下，不得于酸碱混储。防止阳光直射。

"50%单氰胺果树破眠剂 芽早 催树醒 荣芽"的有效成份含量为50(%)，酸度 是30(%)，急性经口毒性为212 (mg/kg)，类别是单氰胺，生产厂家为青岛，急性经皮毒性是1213 (mg/kg)，用途为打破休眠