

蟾蜍衣采集方法，癞蛤蟆衣加工方法采集方法，采集癞蛤蟆衣皮的程序方法

产品名称	蟾蜍衣采集方法，癞蛤蟆衣加工方法采集方法，采集癞蛤蟆衣皮的程序方法
公司名称	山东为民獾子刺猬特种养殖基地
价格	200.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇运河花苑社区西1600米路南（注册地址）
联系电话	17305472971

产品详情

蟾蜍（大的癞蛤蟆），小薄木棒，瓷盘。

蟾蜍（大的癞蛤蟆），镊子，一块玻璃

方法/步骤

将捕到的蟾蜍先洗净泥土，晾干体表水分。为了使蟾蜍耳后腺体分泌功能加强，可采用以下方法：(1)将蟾蜍放入缸中，盖上有孔的缸盖，用竹竿刺痛其头部，使蟾蜍分泌增加；(2)将蟾蜍置于池中，四面放镜，使其恐惧而增加分泌；(3)用辛辣的蒜头、辣椒等纳入其口中，使其分泌增加。

将成年蟾蜍洗净泥土，晾干水分，喂给大蒜、辣椒等腥辣食物，或用小木棍轻敲其头部，刺激它多分泌浆液，然后用金属夹或竹夹、牛角刮刀挤压、刮取头部两侧耳根附近大疣粒（耳后腺）和背部的大小疣粒（皮肤腺）得其浆液，盛入非铁的容器中。刮取时手法力度要适度，用力太小则刮取不尽产量低，用力过大则混有血迹或皮肉碎屑而质量差。若混有杂质应及时用不锈钢镊子等剔除。

3

在采集全过程中应注意以下两点：一是浆液不能接触铁器，否则氧化铁污染蟾酥并使其变色，影响其药用价值及服用效果；二是刮取浆液时应特别小心，不得让其溅入眼内，否则造成眼睛中毒红肿。如果浆液误入眼内应马上用紫草汁液清洗解毒，然后用清水冲洗干净。

4

蟾蜍背上水分干后，用细眼喷壶喷少峡脱衣素在蟾蜍背上。一般用药后4天开始脱皮，10天内全部脱衣。蟾蜍脱衣时从背上开始，其后是头、后腿、腹部、前腿。刚脱下的蟾衣有粘液，用镊子夹住蟾衣于清水中轻轻漂洗干净。然后用不锈钢镊，把蟾衣放在预先准备好的25厘米长、12厘米宽的玻璃板上轻轻拉开成标本模样。拉标本时用力要轻，不要拉破或拉不开。标本制好后，放在室内晾干或放入红外线消毒柜中烘干。一般有九成干即为成品。

如果觉得蟾蜍脱衣素对蟾衣的药用价值有影响，也可直接剥掉蟾衣，但要在冰箱里将蟾蜍冻死后再取。为了治病要少杀生，取够即止，不可有贪念。