

桐乡除四害公司，专业灭鼠除蟑螂服务

产品名称	桐乡除四害公司，专业灭鼠除蟑螂服务
公司名称	杭州蚂零鼠环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区北干街道兴议家园13幢泰岳数字港1503室
联系电话	18867540091 13605817015

产品详情

黄毛鼠广泛分布于长江流域以南，西藏南部亦有发生。是我国南方农田的主要害鼠之一。它危害多种农作物，特别是水稻受害更大。在水稻整个生长过程中，几乎都遭受黄毛鼠危害。

形态特征

体形中等，体长140-175毫米，尾长略大于或等于体长，后足较短，最长不超过34毫米，一般不到32毫米，比褐家鼠要小。背毛黄褐色，腹毛灰白，jia nduan白色基部灰白；尾上、下两白，但不明显，上部较下部深暗，前后足背面浅白色。眶上嵴发达，颞嵴外扩成弧形，后半段则较细弱，不像褐家鼠左右颞嵴近乎平行。颅全长不超过40毫米，鼻骨后端止于前颌骨后端之前方。门齿孔较短阔，后端刚及第1臼齿前端的联线上。

生活习性

1. 栖息

该鼠的适应性很强，栖息地十分广泛，但以作物为主，是作物区的主要鼠种。黄毛鼠一般不入人房，只是在紧靠农田的房舍内才偶有发现。在水稻产区,夏秋季主要穴居于作物地附近的地边、田埂；水稻收割后，则群栖于稻草堆下或其他作物地附近。洞穴比较简单，一般只有2-3个洞口，洞口多向东南方，洞口之间有明显的跑道。在作物地，有临时的更为简单的洞穴。洞口直径30-50毫米，洞形不一,随地势环境而筑。有鼠的洞穴洞口光滑，并有从洞里推出的浮土、鼠类和往来穿行的跑道，也有时发现洞口被泥土堵塞，但当其他洞口被袭击时，即由此洞口逃跑。由于该鼠的分布区气候温暖、食物丰盛，没有贮粮习惯。每个洞穴的鼠数，随着不同季节有较大差别，一般为2-3只，最多达19只。

2. 活动

黄毛鼠主要是夜间活动，以黄昏前后和凌晨活动最为频繁，只有在人烟稀少或隐蔽条件较好的地方，白天才有活动。善游泳，常游过小河到稻田、甘蔗及甘薯等作物地盗食，有时把食物拖入洞口再食，黄毛鼠有转移习性，如水稻收割后，大量迁往附近甘蔗或甘薯地，所以早熟作物或最后收获的作物地，该鼠

较多集中危害。当食物不足时，它们的活动范围也大大扩展，可以走到远距洞穴100-200米以外的其他作物地和水源附近寻食，黄毛鼠的活动常有一定的规律，它们常利用各种地形、地物作隐蔽。例如，喜欢在低凹处通过，喜欢靠壁（田基边、渠边等）行走，也喜欢在草丛下活动，特别是在地边、路边或菜园周围的草丛棘篱下。

3.食性

黄毛鼠是以植物性食物为主的杂食性鼠类。水稻、甘薯、甘蔗、小麦、玉米、花生、豆类瓜菜等，无一不食，但比较喜欢吃营养价值较高的种子食物，而且它的食性往往随着作物的变更而改变。在稻区盗食水稻的孕穗和成熟的谷粒，特别对孕穗的危害较为突出。黄毛鼠大量咬断穗，食孕穗的浆液，在田间往往可见被咬断的稻秆和被吃去浆液的谷壳。