

红叶石楠 红叶石楠球 独干红叶石楠 规格全 品种齐 任君惠顾选购

产品名称	红叶石楠 红叶石楠球 独干红叶石楠 规格全 品种齐 任君惠顾选购
公司名称	沭阳县恒通花卉苗木园艺场
价格	50.00/棵
规格参数	品种:红叶石楠 落叶与否:常绿性 地径:000 (cm)
公司地址	中国 江苏 沭阳县 江苏省沭阳县颜集镇埝下村吉庄组38号
联系电话	86 0527 83396273 18251529961

产品详情

红叶石楠

百科名片

红叶石楠（学名：*photinia serrulata*）是蔷薇科石楠属杂交种的统称，为常绿小乔木，株高4-6米，叶革质，长椭圆形至倒卵披针形，春季新叶红艳，夏季转绿，秋、冬、春三季呈现红色，霜重色逾浓，低温色更佳。做行道树，其杆立如火把；做绿篱，其状卧如火龙；修剪造景，形状可千姿百态，景观效果美丽。红叶石楠因其新梢和嫩叶鲜红而得名。常见的有红罗宾和红唇两个品种，其中红罗宾的叶色鲜艳夺目，观赏性更佳。春秋两季，红叶石楠的新梢和嫩叶火红，色彩艳丽持久，极具生机。在夏季高温时节，叶片转为亮绿色，给人清新凉爽之感觉。

中文学名：	红叶石楠	科：	蔷薇科(rosaceae)
界：	植物界	亚科：	苹果亚科(pomoideae或maloidae)
门：	被子植物门(magnoliophyta)	属：	石楠属(photinia)
纲：	双子叶植物纲(magnoliopsida)	种：	红叶石楠
亚纲：	蔷薇亚纲(rosidae)	分布区域：	在长江流域生长良好，华北大部、华东、华南及西南各省区。
目：	蔷薇目(rosales)		
亚目：	蔷薇亚目(rosineae)		

形态特征

常绿灌木或小乔木，高4—6米，稀可达12米；小枝褐灰色，无毛。叶革质，长椭圆形、长倒卵形或倒卵状椭圆形，长9-22厘米，宽3-6.5厘米，先端尾尖，基部圆形或宽楔形，边缘有疏生带腺细锯齿，近基部全缘，无毛；叶柄长2-4厘米，老时无毛。复伞房花序顶生，总花梗和花梗无毛；花梗长3-5毫米；花白

色，直径6-8毫米。梨果球形，直径5-6毫米，红色或褐紫色。

分布在陕西、华东、中南、西南；印度尼西亚也有。生于海拔1000-2500米的杂木林中。春秋两季，红叶石楠的新梢和嫩叶火红，色彩艳丽持久，极具生机。在夏季高温时节，叶片转为亮绿色，在炎炎夏日中带来清新凉爽之感觉。

植物特性

红叶石楠有很强的适应性，耐低温，耐土壤瘠薄，有一定的耐盐碱性和耐干旱能力。性喜强光照，也有很强的耐荫能力，但在直射光照下，色彩更为鲜艳。红叶石楠生长速度快，且萌芽性强，耐修剪，可根据园林需要栽培成不同的树形，在园林绿化上用途广泛。一至二年生的红叶石楠可修剪成矮小灌木，在园林绿地中作为地被植物片植，或与其他彩叶植物组合成各种图案；也可培育成独干不明显、丛生形的小乔木，群植成大型绿篱或幕墙，在居住区、厂区绿地、街道或公路绿化隔离带应用，当树篱或幕墙一片火红之际，非常艳丽，极具生机盎然之美；红叶石楠还可培育成独干、球形树冠的乔木，在绿地中孤植，或作行道树，或盆栽后在门廊及室内布置。目前我国园林绿化中常绿或半常绿的红叶树种极少，常见的有红花檵木和红叶小檠，但这两个树种的叶片革质化程度低，耐寒性比红叶石楠差；红花檵木仅适宜在酸性土壤种植，红叶小檠虽然对土壤适应性较强，但其为半常绿或落叶树种，且两个树种的叶片均为暗紫红色，无论是生态适应性还是叶片观赏性，都无法与红叶石楠的鲜亮红色相媲美。红叶石楠在国外特别是欧美和日本已广泛应用，被誉为“红叶绿篱之王”。但在国内还是近年新引进开发的树种，目前处于种苗繁育阶段，仅有少量种苗供应市场，尚未有大规模苗木供园林应用，远远不能满足苗圃和园林工程应用的需求。因此该树种市场前景广阔，发展潜力巨大。

品种

市场上普遍存在和工程常用的四个品种的大体情况作一介绍:红罗宾:叶缘锯齿比其他品种明显，个体差异比其他品种大。嫩叶2月下旬始发，随日照加强，春末叶色呈暗红色；嫩枝、新叶均呈鲜红色，直至5月中下旬。9月下旬秋叶萌发，再次呈鲜红色，与其他品种比，红叶期长。但比鲁宾斯短。叶片较大，12厘米~20厘米，叶片表面的角质层较厚，看起来特别光亮，但新叶较其他品种更容易焦叶。萌芽能力强，一年生枝条颜色红色，其生长速度较其他品种快，枝干粗壮，株形紧凑，耐修剪。花期4月~5月。耐最低温度为-12℃，适合在黄河以南的地区栽植。红唇:单叶互生，椭圆状，卵圆形，叶长7厘米~10厘米，长宽比为2:1，叶先端锐尖，叶缘有整齐的小锯齿，新芽红铜色，新叶红色，微粉红色，老叶转变成有光泽的深绿色，叶背面渐淡；叶柄长1厘米~2.5厘米，被绒毛。4月中旬开花，耐寒性相对较差。强健:该品种因生长特别强健而得名。一年生枝条颜色较绿，萌芽能力强，极耐修剪。与其他品种相比，生长更快，枝条更为粗壮，直立性很强，叶片更大，花也更繁茂。但叶片红色持续的时间较其他品种短，叶红色较淡，为带粉的橙红色。抗性强。鲁宾斯:叶片相对较小，一般为9厘米左右，分枝能力一般，叶片枝条比红罗宾、红唇、强健要小，叶片表面角质层较薄，叶色亮红，但光亮程度不如红罗宾。一年生枝条颜色灰暗，春季叶片显红的时间比其他品种要早7天~10天，红叶的时间比其他品种长10天左右。春天新叶红似火漆。秋后叶色鲜红。抗性比其他品种强，相对较耐寒，最低能耐-18℃低温。火艳:色彩变化多样，随气候，土壤，光照等因素产生不同色彩，也是红叶期最长的品种之一。新芽鲜红色,新叶红得发亮而透明，是从光叶石楠杂交而成的新品种。

选购

购买种苗时，要选择信誉好，能提供优质售后服务的供应商，以保证品种的纯正，降低生产风险。

苗圃地的选择和整理

种植地土壤以质地疏松、肥沃、微酸性至中性为好，且灌溉方便，排水良好。种植前，每亩施入腐熟厩肥3000公斤、过磷酸钙50公斤，土壤翻耕深度在25厘米以上，同时施用杀虫剂防治地下害虫。翻耕后将土壤整平，开排水沟，做床面宽度为1米左右苗床。

种苗移栽

移栽的时间一般在春季3—4月和秋季10~11月，具体要结合当地气候条件来决定。定植间距要根据留圃时间和培育目标而定。如计划按培育一年生小灌木出售，株行距以35×35厘米或40×40厘米为宜，每亩约3000株。种苗移栽时，要小心除去包装物或脱去营养钵，保证根系土球完整，定点挖穴；用细土堆于根部，并使根系舒展，轻轻压实。栽后及时浇透定根水。红叶石楠栽后管理

在定植后的缓苗期内，要特别注意水分管理，如遇连续晴天，在移栽后3~4天要浇一次水，以后每隔10天左右浇一次水；如遇连续雨天，要及时排水。约15天后，种苗度过缓苗期即可施肥。在春季每半个月施一次尿素，用量约5公斤/亩。夏季和秋季每半个月施一次复合肥，用量为5公斤/亩；冬季施一次腐熟的有机肥，用量为1500公斤/亩，以开沟埋施为好。施肥要以薄肥勤施为原则，不可一次用量过大，以免伤根烧苗。平时要及时除草松土，防土壤板结。红叶石楠播种繁殖红叶石楠的繁殖技术我们以上介绍的是扦插和种苗移栽，下面，就让我们来介绍一下红叶石楠的播种育苗技术：红叶石楠的繁殖方法以播种为主，将种子进行层积后翌春播种。可在10月下旬采收石楠种子，然后用湿沙混藏于花盆中，来年春季三月中旬取出播种。也可在7至9月进行扦插或于秋季进行压条。一般不需要修剪，也无需特殊的管理。具体播种方法土壤以三分之一的河沙混合做床整平，畦1.3米，行距20厘米，每畦5行，用小锄开沟条播，沟深2至3厘米上覆混合土。到5月间苗，将间下的苗按20×20厘米的株行距栽植，随栽随浇水，成活率高。

观赏应用

生长速度快，且萌芽性强，耐修剪，可根据园林需要栽培成不同的树形，在园林绿化上用途广泛。一至二年生的红叶石楠可修剪成矮小灌木，在园林绿地中作为地被植物片植，或与其他彩叶植物组合成各种图案；也可培育成独干不明显、丛生形的小乔木，群植成大型绿篱或幕墙，在居住区、厂区绿地、街道或公路绿化隔离带应用，当树篱或幕墙一片火红之际，非常艳丽，极具生机盎然之美；红叶石楠还可培育成独干、球形树冠的乔木，在绿地中孤植，或作行道树，或盆栽后在门廊及室内布置。目前我国园林绿化中常绿或半常绿的红叶树种极少，常见的有红花檵木和红叶小檠，但这两个树种的叶片革质化程度低，耐寒性比红叶石楠差；红花檵木仅适宜在酸性土壤种植，红叶小檠虽然对土壤适应性较强，但其为半常绿或落叶树种，且两个树种的叶片均为暗紫红色，无论是生态适应性还是叶片观赏性，都无法与红叶石楠的鲜亮红色相媲美。红叶石楠在国外特别是欧美和日本已广泛应用，被誉为“红叶绿篱之王”。但在中国还是近年新引进开发的树种，目前处于种苗繁育阶段，仅有少量种苗供应市场，尚未有大规格苗木供园林应用

。远远不能满足苗圃和园林工程应用的需求。因此该树种市场前景广阔，发展潜力巨大。

病虫害防治

红叶石楠抗性较强，未发现有毁灭性病虫害。但如果管理不当或苗圃环境不良，可能发生灰霉病、叶斑病或受介壳虫、土蚕等危害。灰霉病可用50%多菌灵1000倍液喷雾预防，发病期可用50%代森锌800倍液喷雾防治。叶斑病可用60%多菌灵300—400倍液或托布津300—400倍液防治。介壳虫可用乐果乳剂200倍液喷洒或800—1000倍液喷雾防治。土蚕的防治宜在栽植前进行，地要适当深耕，并撒含磷类杀虫剂如土虫必杀。如栽后遇土蚕危害，需要及时补救处理，否则蔓延起来危害很大，尤其对幼苗期的红叶石楠，可能造成大面积的死亡。

以上苗木均有小苗出售，各种大小苗规格齐全，价格最低，欢迎各界新老客户光临考察，看苗订货。固定电话：86-0527-83396273 传真：86-0527-83396273电子邮箱：214537172@qq.com邮政编码：223657
销售经理：李向阳（13611541981）

网络监管：范德文（18251529961） 网址：www.lxyu88.cn经营地：江苏省宿迁市沭阳县颜集镇堰下村吉庄组38号

"红叶石楠 红叶石楠球 独干红叶石楠 规格全 品种齐 任君惠顾选购"的品种为红叶石楠，落叶与否是常绿性，株高为0.8（cm），蓬径是40（cm），地径为000（cm），土球直径是0000（cm），树龄为000（年），栽培环境是露地，树形为半球形，园林用途是花境,花坛,盆栽,地被,灌丛,绿篱,湿地绿化,护坡绿化，主要观赏部位为观叶，叶色色系是红色系，色叶类型为春色叶