

攀缘植物 白色木香花 浓郁芳香 庭院必备花木

产品名称	攀缘植物 白色木香花 浓郁芳香 庭院必备花木
公司名称	沐阳县超达花木场
价格	25.00/棵
规格参数	品种:木香花 地径:0.15 (cm) 主蔓长度:3 (m)
公司地址	沐阳县新河镇新槐村
联系电话	13809099669

产品详情

木香是菊科植物云木香和川木香的通称。云木香（学名：saussurea costus），又名广木香或青木香，属菊科风毛菊属。川木香（学名：dolomiaea souliei）是菊科川木香属的植物，均是中国特有的植物。分布在中国大陆的四川、云南、西藏等地，多生长在高山草地和灌丛中，为野生植物，尚未由人工引种栽培。这两种植物的根茎都是重要的中草药。

木香花为常绿或半常绿攀援藤本植物，寿命极长。株高6~10米，小枝绿色，无刺或少量的刺，羽状复叶互生，长2~3.5厘米，宽0.8~1.8厘米。花多朵成伞房花序，着生于短枝先端，花梗长2厘米，花朵直径2-3厘米，花瓣白色或黄色，单瓣或重瓣，有浓郁的芳香，花期4-7月。果实近球形，径3~5厘米。果期9~10月。

云木香

木香花照片集锦(19张)

多年生高大草本。主根粗壮，圆柱形，外表褐色；支根稀疏。根生叶三角状卵形或长三角形，长30~100厘米，宽15~30厘米，基部下延成不规则分裂的翅状，叶缘呈不规则浅裂或波状，疏生短刺，上面深绿色，被短毛，下面淡绿带褐色，被短毛，脉上尤著；叶柄长为叶片的1.5~2倍。花茎高30~200厘米，有细棱，被短柔毛；花茎上的叶长10~30厘米，有短柄或无柄抱茎；头状花序，单一，顶生及腋生，或数个丛生于顶端；总花梗短或无；总苞片约10层，三角披针形，长9~25毫米，外层最短，先端长锐尖，疏被柔毛；花全为管状花，暗紫色，管长1.5厘米，先端5裂，裂片长6毫米，雄蕊5；着生于裂片下方的喉部，花药联合，上端稍分离，有5尖齿；子房下位，花柱外露，柱头2裂；花托有长硬毛。瘦果线形，先

端平截，长6毫米，有枝，上端着生一轮黄色直立的羽状冠毛，长约1.5厘米，果热时多脱落，果顶有时有花柱基部残留。花期7~9月。果期8~10月。

木香花

生长于较高的山地。原产印度。我国云南、广西、四川均有栽培。越西木香多年生草本。根粗壮。茎高约7厘米。茎生叶倒卵形或长椭圆状披针形，长13~30厘米，宽5~12厘米，不分裂或少有不规则的分裂，先端钝，基部逐渐变狭成为长4~10厘米，宽1厘米的叶柄，边缘有波状细齿，膜质，上面有糙伏毛，下面有稀疏的腺状斑点，近于无毛，沿叶脉及叶缘有糙伏毛，上部叶苞片状而小。头状花序多数，约8个，集生。总苞倒卵形，长25~30毫米，5~6层，外层者卵形，中间者倒卵状披针形，近革质，边缘近膜质，先端尖，有骨质细尖头；花多数，较总苞略长，花冠约长26毫米，管部极狭，裂片较冠筒短2倍，外面具腺体；花药天蓝色，约长8毫米；柱头先端具小疣，分枝线形，长3~4毫米。冠毛近3层，全部直立，污黄色。未熟的瘦果光滑，有棱。生于山坡林缘草地。分布四川西南部。川木香多年生草本，根粗壮而直。茎极短。叶根生，卵形或长椭圆状披针形，具长叶柄，5~7对羽状分裂，裂片常为卵状披针形，具细齿，或基部具小裂片，稀见不明显的齿状浅裂，两面均被小粗伏毛，下面具蛛丝状毛和稀疏的腺毛；内层的叶苞片状，具缺刻状或齿状裂，叶柄部分地与花序梗粘合。头状花序6~8个，集生于枝顶；总苞钟状，苞片4层，披针形，绿色带紫；花全部管状。紫色，花冠约长30毫米，管部长约20毫米。冠毛棕黄色，外层冠毛皱曲，向下笼罩瘦果后又向上反折。瘦果四棱形，疏被长柔毛。花期夏、秋。生山坡草地。分布四川西部及西藏等地。

生物学特性 喜冷凉湿润，耐寒、耐旱，怕高温和强光，幼苗期怕直射光。产区在海拔800-2500m山区的阴坡地，选朝北或东北坡向，坡向30°-35°，以土层深厚、疏松肥沃、富含腐殖质、排水良，pH6.5-7.0的砂质壤土和壤土栽培为宜，低洼易涝地长期积水会引起烂根。幼苗期生长缓慢，可与玉米等作物套、间作，又可遮阳。

木香花

栽培技术 用种子繁殖。直播：7-8月采收种子，晒干备用。春播3月中旬至4月上旬；秋播8月上旬至9月中、下旬；冬播种。穴播；按行株距30cm×30cm开穴，穴深3-5cm，播后覆土1cm；条播，按行距30cm开沟播种。每1hm²用种量15kg左右。播后保持土壤湿润，约经15d出苗。苗期需遮荫或在畦两边栽种玉米。田间管理 苗高4-6cm时定苗，每穴留苗3株。每年中耕除草3-4次。幼苗期宜施稀人粪尿，第二年可追施人粪尿或尿素、过磷酸钙。冬季施用腐熟厩及土杂肥、草木灰、饼肥等。干旱季节浇水。冬季地上部枯萎后培土。帛苔孕蕾时，除留种外，全部摘除花苔。秋季将靠近地面的老叶除去，以利通风透光。病早害防治 病害有根腐病，7-8月发病严重，发现病株及时拔除，可用70%五氯硝基苯4kg拌在植株旁边或用福尔马林进行土壤消毒。另有褐斑病、白绢病等为害。早害有银纹夜蛾，可用80%敌百早800-1000倍液喷杀。另有黑蚜、短角负蝗等为害。

云木香

木香花照片集锦(19张)

多年生高大草本。主根粗壮，圆柱形，外表褐色；支根稀疏。根生叶三角状卵形或长三角形，长30~100

厘米，宽15~30厘米，基部下延成不规则分裂的翅状，叶缘呈不规则浅裂或波状，疏生短刺，上面深绿色，被短毛，下面淡绿带褐色，被短毛，脉上尤著；叶柄长为叶片的1.5~2倍。花茎高30~200厘米，有细棱，被短柔毛；花茎上的叶长10~30厘米，有短柄或无柄抱茎；头状花序，单一，顶生及腋生，或数个丛生于顶端；总花梗短或无；总苞片约10层，三角披针形，长9~25毫米，外层最短，先端长锐尖，疏被柔毛；花全为管状花，暗紫色，管长1.5厘米，先端5裂，裂片长6毫米，雄蕊5；着生于裂片下方的喉部，花药联合，上端稍分离，有5尖齿；子房下位，花柱外露，柱头2裂；花托有长硬毛。瘦果线形，先端平截，长6毫米，有枝，上端着生一轮黄色直立的羽状冠毛，长约1.5厘米，果热时多脱落，果顶有时有花柱基部残留。花期7~9月。果期8~10月。

木香花

生长于较高的山地。原产印度。我国云南、广西、四川均有栽培。

越西木香

多年生草本。根粗壮。茎高约7厘米。茎生叶倒卵形或长椭圆状披针形，长13~30厘米，宽5~12厘米，不分裂或少有不规则的分裂，先端钝，基部逐渐变狭成为长4~10厘米，宽1厘米的叶柄，边缘有波状细齿，膜质，上面有糙伏毛，下面有稀疏的腺状斑点，近于无毛，沿叶脉及叶缘有糙伏毛，上部叶苞片状而小。头状花序多数，约8个，集生。总苞倒卵形，长25~30毫米，5~6层，外层者卵形，中间者倒卵状披针形，近革质，边缘近膜质，先端尖，有骨质细尖头；花多数，较总苞略长，花冠约长26毫米，管部极狭，裂片较冠筒短2倍，外面具腺体；花药天蓝色，约长8毫米；柱头先端具小疣，分枝线形，长3~4毫米。冠毛近3层，全部直立，污黄色。未熟的瘦果光滑，有棱。

生于山坡林缘草地。分布四川西南部。

川木香

多年生草本，根粗壮而直。茎极短。叶根生，卵形或长椭圆状披针形，具长叶柄，5~7对羽状分裂，裂片常为卵状披针形，具细齿，或基部具小裂片，稀见不明显的齿状浅裂，两面均被小粗伏毛，下面具蛛丝状毛和稀疏的腺毛；内层的叶苞片状，具缺刻状或齿状裂，叶柄部分地与花序梗粘合。头状花序6~8个，集生于枝顶；总苞钟状，苞片4层，披针形，绿色带紫；花全部管状。紫色，花冠约长30毫米，管部长约20毫米。冠毛棕黄色，外层冠毛皱曲，向下笼罩瘦果后又向上反折。瘦果四棱形，疏被长柔毛。花期夏、秋。

生山坡草地。分布四川西部及西藏等地。

生物学特性 喜冷凉湿润，耐寒、耐旱，怕高温和强光，幼苗期怕直射光。产区在海拔800-2500m山区的阴坡地，选朝北或东北坡向，坡向30°-35°，以土层深厚、疏松肥沃、富含腐殖质、排水良，pH6.5-7.0的砂质壤土和壤土栽培为宜，低洼易涝地长期积水会引起烂根。幼苗期生长缓慢，可与玉米等作物套、间作，又可遮阳。

木香花

栽培技术 用种子繁殖。直播：7-8月采收种子，晒干备用。春播3月中旬至4月上旬；秋播8月上旬至9月中、下旬；冬播种。穴播；按行株距30cm×30cm开穴，穴深3-5cm，播后覆土1cm；条播，按行距30cm开沟播种。每1hm²用种量15kg左右。播后保持土壤湿润，约经15d出苗。苗期需遮荫或在畦两边栽种玉米。

田间管理 苗高4-6cm时定苗，每穴留苗3株。每年中耕除草3-4次。幼苗期宜施稀人粪尿，第二年可追施人粪尿或尿素、过磷酸钙。冬季施用腐熟厩及土杂肥、草木灰、饼肥等。干旱季节浇水。冬季地上部枯萎后培土。帛苔孕蕾时，除留种外，全部摘除花苔。秋季将靠近地面的老叶除去，以利通风透光。

病早害防治 病害有根腐病，7-8月发病严重，发现病株及时拔除，可用70%五氯硝基苯4kg拌在植株旁边或用福尔马林进行土壤消毒。另有褐斑病、白绢病等为害。早害有银纹夜蛾，可用80%敌百早800-1000倍液喷杀。另有黑蚜、短角负蝗等为害。

本场资质材料：

"大量供应攀缘植物 白色木香花 浓郁芳香 庭院必备花木"的品种为木香花，地径是0.15（cm），主蔓长度为3（m），分枝数是3（枝），树龄为3（年），园林用途是棚架绿化、墙体绿化，主要观赏部位为观花，花色色系是白色系，花期为5（月）