

施田补(33%二甲戊灵)

产品名称	施田补(33%二甲戊灵)
公司名称	上海农安生物科技发展有限公司
价格	7.00/瓶
规格参数	有效成分:二甲戊灵 有效含量 :33 (%) 用量:见详细说明 (g/ha)
公司地址	上海市松江区松卫北路295号3幢7层7018室
联系电话	86 021 67730394 13916121461

产品详情

有效成分	二甲戊灵	有效含量	33 (%)
用量	见详细说明 (g/ha)	用途	防除一年生禾本科及部分阔叶
生产厂家	德国巴斯夫股份有限公司	品牌	施田补
剂型	乳油		

声明

最近有人冒充本公司客服代表主动联系经销商，并以低

于市场价许多的价格吸引经销商购买，并要求经销商将

货款打入对方私人帐户，从此杳无音信，在这里公司特

别声明，请各位经销商谨慎处理接到的电话，并能够加

以证明。公司规定经销商将款打入公司帐户：

户名：上海农安生物科技发展有限公司

开户行：农行上海松江区域东支行，

帐号：038505-00040025370

强烈建议使用支付宝，确保您的货款安全

请联系时请认准

唯一官方网站（www.nasw01.com.cn）

客服电话（021--67730394唯一）。

购买须知

（1）公司经销的所有产品均为正品，假一赔十，请放

心购买

（2）经销商在有购买意向后，由本公司向客户发送

《销售合同》（传真号码：021-37717044唯一），

确认发货地址，电话，联系人，产品，数量，规格，和

双方需要履行的责任和义务。

（3）在双方签订《销售合同》后，经销商将货款打入

公司帐户

户名：上海农安生物科技发展有限公司

开户行：农行上海松江区城东支行

帐号：038505-00040025370

强烈建议使用支付宝，确保您的货款安全。

(4) 财务在收到款项后，开出发货单，仓库会在第一时间将货物发出。客服代表会告知您大概的到货时间，请您保持通话畅通。

(5) 经销商在收到货物后，当着司机的面清点货物，在没有问题的情况下，签字认可，本次交易成功完成，如有问题，请马上与公司联系，不要签字，我们会给您处理。如果您请您的朋友代收货，请交代清楚，签字认可也就代表本次交易的成功，如再有问题的话，责任不明

农药登记证号：pd134-91

分装登记证号：pd134-91-f01-126

生产批准证号：hnp32055-c2460

执行标准号：q/320583 glt053-2007

规格：100ml*100瓶通用名称：二甲戊灵

使用指导：

按标签推荐方法使用施田补，可防治或抑制

以下杂草：稗草，马唐，狗尾草，千金子，牛筋

草，碎米莎草；异型莎草，藜，苋，马齿苋，苘

麻，及龙葵（高剂量施药）等一年生杂草。

防治对象和用量

作物	剂量 克有效成分/公顷	剂量 毫升/亩	使用方法
甘蓝 韭菜	495 -743	100-150	移栽前施药：移栽前1-3天施药或老韭菜收割伤口愈合后施药。 播后苗前：种子条播后覆土2-3厘米，然后施药，避免种子直接接触药液。
玉米	743-1485	150-300	播后苗前：将种子播种在2-5厘米深土中后覆土，再施药处理，避免种

			子直接接触药液。 苗后早期：在玉米顶尖萌芽时及禾本科杂草1叶1心、阔叶杂草2叶期以前施药。
棉花(西北地区)	833 -990	175-200	播前混土：先施药后均匀混土3-8厘米深，再播种，最后覆膜;或先施药后混土，然后覆膜，最后播种。
棉花(其它地区)	743 -866	150-175	播前混土：先施药后混土2-3厘米深，然后播种，最后覆膜。 播后苗前：先播种后覆土，然后施药，最后覆膜。覆土时应注意避免种子外露而造成伤害。

注：

1、移栽前施药需保证作物的移栽深度在3厘米以上，并

避免移栽时露根或根系接触到毒土层。

2、播后苗前施药，播种应尽量采用条播，以确保播种

深度。

3、苗后早期：若在玉米顶尖萌芽后施药，可能会出现

暂时的轻微药害，通常作物在1-2周内可恢复正常生

长。

4、采用散播法播种时，因时常发生露籽或难以保证覆

土深度，可能导致药害，应谨慎使用。

5、大棚中应用时，应以当地专家推荐为主;如无使用经

验应做安全试验。

适用:

1、施田补适用于甘蓝、韭菜、玉米及棉花多种旱田作物的选择性除草剂。

2、杀草谱广，可防治多种一年生禾本科及阔叶杂草

3、持效期长，可达45-60天。

4、对作物安全，正常使用下不会引起棉花等作物根部畸形，并增加产量。

5、水溶性及挥发性低。

6、不易光解，可在白天施药。

7、使用方便，可根据不同的作物类型选择播前混土，播后苗前，移栽前及苗后早期使用。

使用注意事项：

1、当杂草危害较重时使用高剂量，每季作物使用该除草剂不超过一次。

2、有机质含量低的砂囊土，使用低剂量：土囊粘重或有机含量超过2%时，使用高剂量。

3、土壤处理时，整地要平整，避免有大土块及植物残

渣。

4、可使用常规背负式喷雾器或拖拉机喷雾器，建议使用

扁扇型喷嘴，喷雾应均匀周到，避免重喷，漏喷或超过推

荐剂量用药。

5、配药时，先往水箱里加入半箱水，然后加入推荐的施

田补剂量，经充分搅拌，再加水混匀。

6、在低温情况下或施药后浇水及降大雨可能会使作物产

生轻微药害或影响药效，施药后7天左右表土干旱也会影

响药效。

7、覆土后再喷药时，切忌用沙子覆土，否则易产生药

害。

8、用药后请勿大水泼浇，以免破坏药土层，并将种子冲

出。

9、施田补不宜在大棚使用，建议用田普代替。

安全措施：

1、施药时必须穿戴防护衣或使用保护设施。

- 2、施药后用清水及肥皂彻底清洗脸及其他裸露部位。
- 3、在清洗药械或处理废弃物时不要污染水及水源。
- 4、避免吸入雾液。
- 5、避免药液接触皮肤、眼睛或衣物。
- 6、不要在有热源或明火处使用，倒灌该产品。
- 7、用过的容器应清洗三次，然后用做再生材料，或埋藏，或焚烧。

贮藏：

- 1、远离家畜，食品和饲料，放置于儿童触及不到的地方并加锁。
- 2、保持容器处于密封状态。
- 3、不要直接置于阳光下，或过热，或低于0 的地方，在过渡低温度下储存可能产生结晶。

急救措施：

- 1、不慎药液接触眼睛，用清水冲洗眼睛至少15分钟，如

有刺激发生，携此标签请医生诊治。

2、不慎误食或吞服药液，勿引吐，携此标签立即就医。

3、医生处置：由于有引起化学肺炎及肺水肿的危险，引

吐应在专业医师的监督下进行。