

# 绍兴诸暨白蚁防治单位，树木白蚁防治技术

产品名称	绍兴诸暨白蚁防治单位，树木白蚁防治技术
公司名称	杭州蚂零鼠环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区北干街道兴议家园13幢泰岳数字港1503室
联系电话	18867540091 13605817015

## 产品详情

樟树的白蚁防治方法:

### 1.人工生物防治

(1) 改善园地生态环境，加强栽培管理，如[冬季翻耕土壤](#)，消灭越冬虫茧，减少虫源。结合冬季修剪，彻底剪掉带虫枝烧毁。结合冬季修剪，彻底刷掉留茬上的成、[若虫](#)。樟巢螟在[幼虫](#)活动初期时，人工摘除虫包，消灭内幼虫。

(2) 加强水肥管理，增加植被，被天敌创造栖息生活繁殖场所。

(3) 注意保护和利用[瓢虫](#)、[草蛉](#)、[寄生蜂](#)、[寄生蝇](#)及[微生物](#)等天敌。

(4) 利用虫害本身的特性，列如根据大衰蛾[趋光性](#)

，用黑光灯诱杀成虫，应用大衰蛾性外激素诱杀成虫。2.化学防治(1) 防治樟巢螟，在幼虫初孵期，未缀叶形成包前，及时喷洒90%敌百虫结晶1000~1500倍液，或50%辛硫磷乳油1000~1500倍液毒杀。

(2) 防治大衰蛾、小衰蛾、茶衰蛾，

掌握2龄幼虫盛期及时喷药，[药剂](#)

有5

0%马拉

松乳剂1000倍

液，或20%菊杀乳油200倍液

。根据幼虫活动时间在傍晚，故宜在傍晚喷药，[虫体](#)

接触药剂机会较多，可提高要效。防治大衰蛾时，用青虫菌液(含活孢100亿/mL)喷雾。

(3) 当红蜘蛛虫口密度大的树在[春梢](#)芽长1~2cm为冬卵盛孵期，[虫子](#)

末上新梢叶片上危害时，

喷第1次药，以后根据虫情的发展和天敌数量的多

少、[气候](#)

情况，决定第2次药，一般猖狂年份7天喷第2次。应用20%三氯杀螨醇乳油800倍液，或73%克螨特乳油2000倍液，或20%杀螨酯可湿粉剂600~800倍液。杀虫剂有胶体液400倍液；石硫合剂春季用0.3~0.5波美度，冬季用1~2波美度；松脂合剂春季用18~20倍液，冬季用8~10倍液。在3~5月和9~10月保护利用或助迁引进食螨瓢虫，控制春梢和秋梢上柑橘全爪螨的危害。或当全爪螨平均每叶2头以下，每株释放捕食螨200~400头，放后1个多月可控制其发展危害，但放后注意不要喷药，有效期可控制半年以上。(4) 防

治  
黑蛻  
白轮蚧，  
在冬季修剪后往留  
茬上喷3~5波美度的石硫合剂。于若虫孵化活动期喷洒药效长的强触杀剂毒杀若虫。