

公司常年供应各种一代脱毒马铃薯种薯土豆种子

产品名称	公司常年供应各种一代脱毒马铃薯种薯土豆种子
公司名称	北京金农丰源种子销售有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:土豆种子 型号:早熟 等级:1级
公司地址	北京大兴区西红门
联系电话	86-01060295171 18801247085

产品详情

栽培要点：

- 1.该品种属极早熟、丰产型品种，对土壤、肥水管理要求较高。应选择疏松肥沃的轻质壤土和沙壤土，偏轻酸性为宜，忌与茄科、十字花科及块根作物轮作。播前深松土壤十分重要，建议深度应在25—30厘米。
- 2.该品种耐肥水，施肥应施早施足，一般底肥要求亩施腐熟的农家肥3000公斤，复合肥50公斤，过磷酸钙20公斤。追肥量依田间营养表现而定，也可在幼苗期、结薯期、膨大盛期各喷1次0.3%的磷酸二氢钾叶面肥。后期还可适当选用生长调节剂以延缓其衰老。
- 3.早春覆膜栽培种植不宜过密，每亩一般种植4200株左右为宜。
- 4.由于其块茎对光敏感，播种深度宜深播12-13厘米，常耕栽培还应及早多次中耕并高培土，以防出现青皮现象而影响品质。
- 5.播种时用辛硫磷浇施定植沟，防地下害虫，播后盖膜前应喷施芽前除草剂进行化学除草。播前土壤墒情应保持在田间最大持水量的75%左右，之后水份管理应遵循早期浇水要少，中期要饱，晚期要小的原则。

6.针对其易感晚疫病的缺点，病害应以预防为主并从种薯抓起，播种期选用适宜的药剂拌种或浸种，如可选用58%雷多米尔—锰锌可湿性粉剂按用种量0.3%拌种薯块，同时注意进行切刀消毒，以减少种薯带菌量。齐苗后，当苗长10~15cm时，就可结合预防早疫病，每隔7~10d用代森锰锌、百菌清等保护性杀菌剂交替喷施，连防4—5次。喷药时还可结合喷施补钙的叶面肥以增强抗寒力，提高其抗逆性。遇到连续的阴雨天气后更应及时预防。若已发现病株要及时剔除，同时加以瑞毒霉、乙磷铝、克露等内吸治疗性杀菌剂交替喷施。

总之，栽培上要做到选好地、播好种、施足肥、管好水，早管理、早防病，相信迎面的便是丰收在望。

优质脱毒中熟、高产 —— 大西洋

特征特性：中熟，出苗后90天收获。株型直立，分枝数中等，株高50厘米左右；叶绿色，复叶肥大，叶缘平展。花冠淡紫色。块茎圆形或短椭圆形，单株结薯4~6个，结薯集中，中型薯率高，薯形整齐，薯皮淡黄色、粗糙有网纹，薯肉白色，芽眼浅而少。块茎休眠期中等，耐贮藏。淀粉含量16%~18%，还原糖0.03%~0.15%，是目前用于炸片的主要品种。植株易感晚疫病和环腐病；对马铃薯X病毒免疫，较抗马铃薯卷叶病毒；不耐干旱和高温，在干旱高温条件下，块茎内部易产生褐色斑点，影响炸片品质。一般单产2000~2500公斤/亩。

该品种适应性较广，在内蒙古、黑龙江、吉林、甘肃等一季作地区，以及山东、河南、江苏、上海等二季作地区都有栽培。该品种喜肥水，尤其结薯期不能缺水。块茎过大时易产生空心，因此，应适当密植，密度为4500~5000株/亩。

优质脱毒、高产、抗旱品种

——2191/冀张薯8号/大白花

冀张薯8号：张家口市农科院马铃薯研究所育成。又名小白花、大白花或2191。2006年6月通过国家品种审定委员会审定。晚熟品种，生育期110天，株形半直立，株高70 - 80厘米，分枝较多，叶色浓绿，花冠白色，天然结实，块茎椭圆，白皮白肉，芽眼浅，结薯较集中，大、中薯率达84%。田间抗病毒病、晚疫病。淀粉含量17%，还原糖含量低于0.2%，一般亩产1500 - 2000公斤，最高可达4000公斤。属耐贮藏鲜食品种，适于北方水肥条件高地块种植。种植密度每亩3300株左右。

优质脱毒、高产、抗旱中熟马铃薯品种

中熟品种，生育日数110天左右（播种至收获）。株型开展，株=无天然结实。块茎椭圆形，大而整齐，白皮白肉，表皮光滑，芽眼深度中等，结薯集中，块茎休眠期较长，耐贮藏。植株较抗晚疫病、块茎感病；对环腐病免疫；抗马铃薯x病毒和y病毒，高抗马铃薯卷叶病毒，对马铃薯纺锤块茎类病毒（pstvd）有抗病性；根系发达，耐旱性极强；耐贮藏。丰产性好，一般单产2000~2500公斤/亩，高产可达3500公斤

。

该品种适应性广，主要分布在黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、山西、宁夏等省，中原二作区的山东、安徽、浙江、上海等省市也有栽培。目前，内蒙古的乌兰察布盟700万亩马铃薯，其中克新1号占95%。一般种植密度3500~4000株/亩。