

消毒剂 月苳三甲氯铵 苯扎溴铵 戊二醛

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 消毒剂 月苳三甲氯铵 苯扎溴铵 戊二醛 |
| 公司名称 | 山西菲尔普斯科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 山西菲尔普斯 型号: 消毒剂 |
| 公司地址 | 山西省太原市高新开发区136号 |
| 联系电话 | 0351-7042152 13934564587 |

产品详情

月苳三甲氯铵

【执行标准】《农业部兽药质量标准》2003年版

【主要成分】十二/十四烷基苳基三甲基氯化铵

【性 状】无色至淡黄色透明液体：振摇时有泡沫产生。易溶于水。

【适用范围】消毒杀菌剂。用于养殖水体、畜禽厩舍、养殖器具的消毒灭菌。防治鱼、虾、蟹、贝、鳖、蛙等水产动物出弧菌、嗜水气单胞菌、爱德华氏菌等细胞引起的出血、烂鳃、腹水、肠炎、疔疮、腐皮等细菌性疾病。

【用法用量】（1）水产：将本品用300 - 500倍水稀释后，全池均匀泼洒。治疗：每立方米水体用（以月苳三甲氯铵计）0.15g - 0.5g，每隔2 - 3天用一次，连用2 - 3次。预防：同治疗量，15天一次。

（2）畜禽：畜禽舍消毒喷洒1：2500倍稀释，器具浸涂1：10000倍稀释。创面消毒0.01%溶液皮、手术器械消毒0.05%溶液。

【不良反应】本品按推荐的剂量使用，未见不良反应

【注意事项】1、勿用金属容器盛装。2、禁与阴离子表面活性剂、碘化物和过氧化物等混用。3、软体动物、鲑等冷水性鱼类慎用。4、水质较清的养殖水体慎用。5、使用后注意池塘增氧。6、包装物使用后集中销毁。

【休药期】无

【原料规格】50%、70%

【检测方法】按《农业部兽药质量标准》2003年版

【有效期】二年

【包装规格】50kg/桶；200kg/桶

【贮藏】避光、密封、干燥处保存

苯扎溴铵

【执行标准】《兽药地方标准上升国家标准》第一册

《中华人民共和国兽药典》2005年版

【主要成分】苯扎溴铵，溴化二甲基苄基羟铵。

【性状】无色至淡黄色透明液体：振摇时有泡沫产生。易溶于水。

【药理作用】苯扎溴铵通过所带的正电荷与微生物细胞膜上的带负电荷的基团生成电价键,电价键在细胞膜上产生应力,导致溶菌作用和细胞的死亡;还能透过细胞膜进入微生物体内,导致微生物代谢异常,致使细胞死亡。

【适用范围】用于养殖水体、养殖器具的消毒灭菌.防治鱼、虾、蟹、鳖、蛙等水产动物由弧菌、嗜水气单胞菌等细菌引起出血、烂鳃、腹水、肠炎、疔疮、腐皮等细菌性疾病。

【用法用量】将本品用300-500倍水稀释后全池均匀泼洒。治疗：每1m³水体0.1-0.15g(以有效成分计)每隔2-3天用一次连用2-3次。预防：15天一次(剂量同治疗量)

【注意事项】1、勿用金属容器盛装。2、禁与阴离子表面活性剂、碘化物和过氧化物等混用。3、软体动物、鲑等冷水性鱼类慎用。4、水质较清的养殖水体慎用。5、使用后注意池塘增氧。6、包装物使用后集中销毁。

【休药期】无

【不良反应】本品按用法与用量使用，未见不良反应

【原料规格】80%、70%、45%

【检测方法】按《中华人民共和国兽药典》2005年版

【有效期】二年

【包装规格】50kg/桶；200kg/桶 【贮藏】避光、密封、干燥处保存

戊二醛

【执行标准】《兽药地方标准上升国家标准》第一册

《中华人民共和国兽药典》2005年版

【主要成分】戊二醛

【药理作用】戊二醛碱性水溶液具有较好的杀菌作用。当pH为7.5-8.5时，作用最强，可杀灭细菌的繁殖和芽孢、真菌、病毒，其作用较甲醛要强。

【性状】淡黄色澄清液体，有刺激性特臭。

【适用范围】用于水体消毒，防治水产养殖动物由弧菌、嗜水气单胞菌、爱德华氏菌等引起的细菌性疾病。

【用法用量】用水稀释300-500倍，全池均匀泼洒。

治疗：每1m³水体40mg(以戊二醛计)，即相当于每1m³水体用本品80mg，每2-3天一次，连用2-3次。

预防：15天一次(剂量同治疗量)

【不良反应】本品按推荐的剂量使用，未见不良反应

【注意事项】1、勿用金属容器盛装。2、避免接触皮肤和粘膜。3、水质较清的瘦水塘慎用。4、勿与强碱类物质混用。5、使用后注意池塘增氧

【休药期】500度日

【原料规格】50%

【检测方法】按《中华人民共和国兽药典》2005年版

【有效期】二年

【包装规格】50kg/桶；200kg/桶

【贮藏】避光、密封、干燥处保存

复方戊二醛(水产专用)

【执行标准】《兽药地方标准上升国家标准》第一册

《进口兽药质量标准》2006年版

【主要成分】戊二醛、癸甲溴铵（也可以由戊二醛与癸甲氯铵、苯扎氯铵、苯扎溴铵、双季铵盐等产品中的一种复配）

【性状】淡黄色澄清液体，有刺激性特臭。

【适用范围】用于水体消毒，防治水产养殖动物由弧菌、嗜水气单胞菌、爱德华氏菌等引起的细菌性疾病。

【用法用量】用水稀释300-500倍，全池均匀泼洒。

治疗：每1m³水体20mg(以戊二醛计)，即相当于每1m³水体用本品60mg，每2-3天一次，连用2-3次。

预防：15天一次(剂量同治疗量)

【不良反应】本品按推荐的剂量使用，未见不良反应

【注意事项】1、勿用金属容器盛装。2、避免接触皮肤和粘膜。3、水质较清的瘦水塘慎用。4、勿与强碱类物质混用。5、使用后注意池塘增氧

【休药期】500度日

【原料规格】戊二醛30%、羟铵盐20%；戊二醛30%、羟铵盐30%

【检测方法】按《进口兽药质量标准》2006年版

【使用方法】按《进口兽药质量标准》2006年版

【有效期】二年

【包装规格】50kg/桶；200kg/桶

【贮藏】避光、密封、干燥处保存