

有机核桃（元丰）

产品名称	有机核桃（元丰）
公司名称	枣庄市台儿庄区憩养园有机核桃专业种植合作社
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市台儿庄区涧头集镇徐楼村
联系电话	0632-6629001 15206323393

产品详情

提高核桃产量质量，增加农民收入，提高核桃树嫁接成活率是关键，主要掌握以下技术要点：

1、采集接穗

春季枝接的接穗，以萌动前20~30天（2月底以前）采集为佳。接穗要从生长健壮、无病虫害的优良品种母树上采集。接穗以粗度1~2cm、髓心小、芽饱满的1年生发育枝为佳。

2、嫁接时间

枝接以砧木萌芽后展叶3~5cm长时最佳，一般在4月上旬至5月上旬。嫁接过早或过晚均不利于成活。

3、嫁接方法

枝接多采用插皮舌接，具体操作方法：（1）削接穗。将蜡封好的接穗下端削成6~8cm长的薄舌状马耳形平滑剖面。刀口一开始要向下切凹，并超过髓心，然后斜削，保证整个斜面较薄。（2）砧木的处理。先在欲改接树干（枝）平直光滑处锯断，然后削平断面。在接口处横削一个2~3cm宽的月牙状切口，在切口下部由下至上轻轻削去粗老树皮，留2~3cm厚的嫩皮，削面略长于接穗剖面。（3）插接穗。用手捏开接穗削面前端的皮层，沿月牙状切口将接穗的木质部徐徐插入砧木的木质部与皮层之间，露白0.5~1cm，使接穗的皮层敷贴在砧木的嫩皮上。接口直径小于3cm时，可插1根接穗；4~6cm时，可插2根；7cm以上时，插3根。（4）绑扎。用塑料薄膜将接口包严，然后用塑料绳绑缚4~5圈，以绑紧绑牢为度。（5）遮阴。用8开的废旧报纸卷一纸筒，套在接口和接穗外面，下端绑扎在接口处，上端口扎紧，以防风吹日晒，并实现暗光愈合。（6）砧木放水。核桃树不同于其他果树，嫁接时常有伤流液从接口处溢出，影响嫁接成活率。因此，高接时在树干基部距地面10~20cm处，螺旋状交错斜锯2~3个放水口，深达主干直径的1/5~1/4，让伤流液流出。

4、接后管理

嫁接后，要及时跟上除萌、放风、剪砧、绑防风柱、松绑、防治病虫害等措施，以提高嫁接成活率。

