

捕食螨-红蜘蛛的克星

产品名称	捕食螨-红蜘蛛的克星
公司名称	碧海行动(潮州)农业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地/厂家:广东省潮州市金玉柑桔有限公司 等级:A 品种:柏氏钝绥螨(活性强)
公司地址	中国 广东 潮州市湘桥区 凤新街道十亩新意巷6横1号
联系电话	0086 0768 2101782 13670760234

产品详情

产地/厂家	广东省潮州市金玉柑桔有限公司	等级	A
品种	柏氏钝绥螨(活性强)	类型	经济型
物种特征	爬行性 (活性强)		

中国“捕食螨”生物防治技术防治柑桔红蜘蛛介绍柑桔红蜘蛛的为害，历来是柑桔种植户最为头疼的问题。“捕食螨”生物防治技术.该项技术经公司技术专家及大学教授精心研究.通过采集野生钝绥螨进行人工繁殖.经过反复试验.终于成功总结出一套工厂化繁殖钝绥螨先进技术.并在柑桔园试验成功。取得了连续控制柑桔红蜘蛛为害长达13个月的显著防治效果。该项技术深受广大柑桔种植户的欢迎。“以螨治螨”生物防治技术应用要求：一、使用对象

3~5年生柑桔树。或者是树冠大于1米以上的柑桔树。二、清园 “以螨治螨”生物防治技术是柑桔红蜘蛛防治的一项全新技术。。要求在红蜘蛛低密度的条件下释放捕食螨，释放前7—8天.检查红蜘蛛基数.若每叶平均超过2只以上.则应用0.5% 1500倍液印楝素或其它生物农药进行喷洒.对锈蜘蛛介壳虫也要低毒喷洒.以压低虫口密度.再释放.释放后必须禁止使用化学农药.为捕食螨创造良好生存环境条件.这样受益较大.效果显著。三、果园种(留)草 果园实施“生草控制”管理.释放捕食螨的果园一定要种(留)草，为捕食螨提供补充食物源和良好的栖息环境条件。每次对杂草处理不能超过总量的一半.捕食螨释放后严禁喷洒除草剂.以后根据捕食螨.红蜘蛛的生长情况再进行割除.尽量保持果园生态环境稳定.以确保捕食螨和其它天敌生存空间。

四、释放时间 果园释放捕食螨的时间，应根据果园的具体情况而定，一般应在果园用药低峰期.春季在晴天或阴天释放.禁止雨天释放..温度20摄氏度为宜.秋季晴天或阴天释放温度20—25摄氏度为宜.五、释放量 每年一次.每株一包 (3~5年生柑桔树。或者是树冠大于1米以上的柑桔树。)六、释放方法 将装有捕食螨的包装袋沿虚线剪下.把袋盖.盖于顶端防止雨水渗入.再用图钉按在树中间的树叉上以防雨淋及蚂蚁侵害。七、注意事项 1、捕食螨从出厂到释放，一般不超过15天； 2、运回未释放的捕食螨，不得将其置于被阳光直射的、高温高湿、有毒、受其他竿物侵扰的地方，一般可在15~28度的条件下保存10-15天； 3、不要用力捏、挤压装有捕食螨的袋子。

4、不能分装释放或隔株释放，也不能移动释放，更不能撒施。 5、要做好果园清园和释放捕食螨时间上的衔接建议最好在3月下旬至4月上旬施放，此时虫口基数适中，且可控制4—5月的虫口高峰，效果会更好一些。 300亩生态果园欢迎参观.本包装已申请专利. 申请号: 200730296277.4科技支持单位：华南农业大学昆虫生态研究室监制