

替西帕肽（zepbound）与替尔泊肽（mounjaro）推荐给药方案翻译服务

产品名称	替西帕肽（zepbound）与替尔泊肽（mounjaro）推荐给药方案翻译服务
公司名称	广州市番禺区替西帕肽商务信息咨询服务中心
价格	600.00/件
规格参数	
公司地址	番禺区石楼镇赤岗村清颖大街
联系电话	13580913774

产品详情

上海北京山东内蒙古四川黑龙江替西帕肽（zepbound）与替尔泊肽（mounjaro）推荐给药方案翻译服务

一. 替西帕肽（zepbound）与替尔泊肽（mounjaro）是什么？

替西帕肽（zepbound）与替尔泊肽（mounjaro）是美国礼来公司研发的革命性创新药物，其核心成分为tirzepatide。这款药物作为首个GLP-1和GIP双层激动剂，以其独特的双重作用机制，为糖尿病和减重领域注入了新的活力。

GLP-1，即胰高血糖素样肽-1，是一种肠道产生的激素，它像是一位精明的指挥家，精准地调控着胰岛素和胰高血糖素的分泌，使得血糖水平得以保持在一个稳定的范围内。而GIP，即葡萄糖依赖性促胰岛素多肽，则像是一位youxiu的助手，与GLP-1协同作战，共同促进胰岛素的分泌和葡萄糖的利用。

替西帕肽巧妙地将这两种激素的优点结合在一起，通过同时激活GLP-1和GIP受体，实现了对血糖和体重的双重调控。它不仅能够有效降低血糖，减轻糖尿病患者的痛苦，还能够通过减少食欲和增加能量消耗来达到减重的目的。这一双重作用机制让替西帕肽在糖尿病和减重领域展现出了巨大的潜力。

美国礼来公司在研发替西帕肽的过程中，投入了大量的精力和资源。科研人员们深入研究GLP-1和GIP的作用机制，经过无数次的试验和改进，终于成功地将这两种激素的优点结合在一起，创造出了这一具有划时代意义的药物。替西帕肽的问世，无疑为糖尿病患者和肥胖人群带来了更加有效的治疗方法，让他们的生活焕发出新的希望。

二. 替西帕肽（zepbound）与替尔泊肽（mounjaro）推荐给药方案

1. 替西帕肽的推荐起始剂量为2.5mg皮下注射，每周一次。2.5毫克的剂量是治疗开始，并不是为了减重。（替尔泊肽有2.5mg 5mg 7.5mg 10mg 12.5mg 15mg每支共6个规格）

2. 4周后，增加剂量至5mg皮下注射，每周1次。

3. 如果需要额外的减重控制，在当前剂量至少4周后，增加2.5毫克的剂量。

4. 替西帕肽的最大剂量为15mg皮下注射，每周一次。

5. 如有必要，每周给药的日期可以改变，只要两次给药间隔时间至少为3天(72小时)。

6. 替西帕肽 (zepbound) 与替尔泊肽 (mounjaro) 推荐给药方案表格：

7. 如果漏用一剂，应指导患者在漏用后4天(96小时)内尽快使用替西帕肽，如果超过4天已经过去，跳过错过的剂量，并在定期安排的一天给下一次剂量。在每种情况下，患者可以恢复每周一次的常规给药时间表。

以上翻译的信息仅供参考，更多翻译信息请咨询我们！