

# GB/T27780-2011杀鼠器械粘鼠板标准内容及国内测试机构

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | GB/T27780-2011杀鼠器械粘鼠板标准内容及国内测试机构   |
| 公司名称 | 广东杰信检验认证有限公司                       |
| 价格   | .00/个                              |
| 规格参数 | 用途:销售、质量控制<br>检测对象:粘鼠板<br>检测周期:一个月 |
| 公司地址 | 广州市天河区中山大道建工路19号2楼                 |
| 联系电话 | 13760668881 13760668881            |

## 产品详情

粘鼠板是大众灭鼠常用的捕鼠器械之一，使用方便，而且环保又实惠。粘鼠板之所以使用广泛，究其原因还是因为其十分便捷，任何人都可以使用，不需要专业的只是，只要把粘鼠板打开，放置在老鼠经常出没的地方，用不了多久就会有老鼠自投罗网，而一旦老鼠被粘鼠板粘住，基本上也就宣告了它生命的终结。

怎样的粘鼠板算是合格的产品呢？由广东省预防控制中心、北京市预防控制中心、吉林省预防控制中心共同起草的GB/T 27780—2011《杀鼠器械实验室效果测定及评价 粘鼠板》标准对粘鼠板产品做出了要求。

1 范围 本标准规定了粘鼠板实验室粘捕鼠类效果试验方法及评价。

本标准适用于粘鼠板实验室粘捕鼠类效果评价。

2 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 2.1有效接触 valid contact

一个时间点，试鼠有三个身体点同时处在粘鼠板的有效粘胶面里。 2.2逃脱 escape试鼠与粘鼠板经有效接触后，不被粘住。

3 试验动物 选择体重180g~220g的标准实验室成年大白鼠作为试鼠，雌雄各半。

4 试验材料 粘鼠板样品,隐蔽箱（不透明,200mm×200mm×300mm）。

5 测试条件 温度：26 ±1 ；相对湿度：60%±5%；测试室面积：3.24m<sup>2</sup>~9.0m<sup>2</sup>。

6 操作步骤 6.1将饲料、水和1个隐蔽箱布放在测试室墙根。 6.2将1只试鼠称重后放入测试室。

6.3正常供水、食饵，24h后待其活动正常后，在测试室内沿墙根布放1块粘鼠板。

6.4观察其24h的粘鼠情况。 6.5重复6.1~6.4步操作。整个测试过程需有效接触粘鼠板的试鼠总数不少于30只，记录测试鼠总数、有效接触粘鼠板的试鼠总数、被粘捕的试鼠数和逃脱的试鼠数，计算粘捕率(%)及逃脱率(%)。

7 结果表述 粘捕率按公式(1)计算：

式中：T——粘捕率；S——粘捕试鼠数；M——测试鼠总数。 逃脱率按公式(2)计算：

式中：E——逃脱率；S——粘捕试鼠数；N——有效接触粘鼠板的试鼠总数。

8 评价指标 逃脱率 10%且粘捕率 90%为效果显著。

我们总部实验室卫检所可以做GB/T

27780粘鼠板标准的测试，可以出资检测报告，有需求的企业可以与我们联系。 联系人：邹工

---

#### 相关知识

粘鼠板捕鼠效果不好的原因有多种，主要有以下几个方面：1、粘鼠板的用量和放置位置：如果粘鼠板的用量太少或放置位置不正确，就很难捕获老鼠。一般来说，每十平米放置一张粘鼠板是比较合理的，而且要放在老鼠经常经过和出没的地方，如墙角、门框等。2、老鼠的行动轨迹：老鼠都有固定的行动路线，如果粘鼠板没有放在其经常经过的地方，捕获效果就会大打折扣。因此，在放置粘鼠板之前，先观察老鼠的行动轨迹。3、频繁移动粘鼠板：频繁移动粘鼠板会使老鼠对胶水失去信任，从而避免从粘鼠板上经过。因此，放置粘鼠板后应保持其位置不变，并定期检查。4、粘鼠板的质量问题：如果粘鼠板的质量不好，胶水的粘性不强，就容易让老鼠挣脱。因此，应购买正规厂家生产的粘鼠板，以确保其质量和效果。5、环境因素：如果粘鼠板放置的环境潮湿、多尘或有水，就会影响到胶水的粘性，从而降低捕鼠效果。因此，应将粘鼠板放在干燥、干净的环境中。6、人为因素：在使用粘鼠板的过程中，如果处理不当，如用手直接触碰粘鼠板上的老鼠等，就会破坏胶水的粘性，影响捕鼠效果。在潮湿的环境，比如在餐厅后厨，有积水、油烟、灰尘比较大，褐家鼠和黄胸鼠比较严重，一般布放鼠板很难抓到老鼠。主要原因：1、胶水是有机物质与水无机物不相溶 地面潮湿，而且褐家鼠喜欢从地沟上来，浑身湿淋淋的很难被粘到。胶水是有机物质与水无机物不相溶。

2、油烟对胶水性能有影响厨房油烟灰尘大，对粘鼠板的胶水性能有影响。

粘鼠板捕鼠效果不好的原因有多种，主要有以下几个方面：1、粘鼠板的用量和放置位置：如果粘鼠板的用量太少或放置位置不正确，就很难捕获老鼠。一般来说，每十平米放置一张粘鼠板是比较合理的，而且要放在老鼠经常经过和出没的地方，如墙角、门框等。2、老鼠的行动轨迹：老鼠都有固定的行动路线，如果粘鼠板没有放在其经常经过的地方，捕获效果就会大打折扣。因此，在放置粘鼠板之前，先观察老鼠的行动轨迹。3、频繁移动粘鼠板：频繁移动粘鼠板会使老鼠对胶水失去信任，从而避免从粘鼠板上经过。因此，放置粘鼠板后应保持其位置不变，并定期检查。4、粘鼠板的质量问题：如果粘鼠板的质量不好，胶水的粘性不强，就容易让老鼠挣脱。因此，应购买正规厂家生产的粘鼠板，以确保其质量和效果。5、环境因素：如果粘鼠板放置的环境潮湿、多尘或有水，就会影响到胶水的粘性，从而降低捕鼠效果。因此，应将粘鼠板放在干燥、干净的环境中。6、人为因素：在使用粘鼠板的过程中，如果处理不当，如用手直接触碰粘鼠板上的老鼠等，就会破坏胶水的粘性，影响捕鼠效果。老鼠被粘住之后会奋力挣脱，由于老鼠不像人类这么聪明，无法准确认识到“无法挣脱”的事实，所以它们奋力挣脱的尝试几乎不会停止，时间一长便会力竭而亡。当然，在老鼠家族之中也有一些个体比较懒惰，它们不会因为窒息或力竭而迅速死亡，也正是因为如此，它们会承受更多的痛苦，最终在饥饿中死去。看到粘鼠板上的老鼠，有时我们会感到有些可怜，但老鼠这种动物对于人类的危害实在太大了，它们不仅会

污染环境、破坏粮食和农作物，还会传播，人类历几次大规模的鼠疫流行都是十分可怕的。 —————

—————行业资讯 清热、感冒发烧用于鸡群感冒发烧，用鬼针草煎水后给大群引用，效果很好。上呼吸道感染在春秋交替的时候，鸡群很容易出现呼吸道，鬼针草对于呼吸道有着很好的预防和作用，在的时候搭配着西药，效果也很好。提高免疫力我经常给鸡群采摘鬼针草，然后让它自由采食，大群的涨势很好，整齐度也很高，免疫力增强。桂珍才到处是宝，我们那边叫鬼尖头，治高血压。小时候摘花来做飞镖，回想一下还很好玩。根据农作物发病情况选择品种作物的发病程度，受当地气候条件、土壤环境和作物品种本身的抗病性影响。生产中可根据上年度或近几年病害发生情况选择适宜的品种。如上年或近几年病害发生较重的作物要选择对同一病害具有较强抗病能力的品种。如发病较轻，可选择抗病能力一般的品种。在玉米品种的选择上，还要注意过去曾发生过严重的丝黑穗病的地块必须选择高抗丝黑穗病的品种，以防丝黑穗病的tr气温较高时，十分适合蚯蚓生长繁殖。养殖方式落后由于很多农户采取散养的方式进行育肥牛养殖,缺乏集中养殖的思想,导致了养殖技术的落后。在这种方式的养殖下,一个农民最多只能养10头牛,且养殖效率较低。6饲料效果不佳由于育肥牛主要是输送到市场进行售卖,因此在养殖方式上不能沿用传统的家养牛的养殖方式,同时,养殖饲料也不能依靠家养牛的饲料进行养殖。在育肥牛的养殖过程中,需要时刻保障营养的充足,采用精饲料进行养殖。然而在很多养殖户,采用秸秆或青草进行饲养,导致育肥牛的营养达不到要求,不利于市场的发展,同时也导致经济效益的下降。