

GB/T27780-2011杀鼠器械粘鼠板标准方法及国内测试机构

产品名称	GB/T27780-2011杀鼠器械粘鼠板标准方法及国内测试机构
公司名称	广东杰信检验认证有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途:销售、质量控制 检测对象:粘鼠板 检测周期:一个月
公司地址	广州市天河区中山大道建工路19号2楼
联系电话	13760668881 13760668881

产品详情

粘鼠板是大众灭鼠常用的捕鼠器械之一，使用方便，而且环保又实惠。粘鼠板之所以使用广泛，究其原因还是因为其十分便捷，任何人都可以使用，不需要专业的只是，只要把粘鼠板打开，放置在老鼠经常出没的地方，用不了多久就会有老鼠自投罗网，而一旦老鼠被粘鼠板粘住，基本上也就宣告了它生命的终结。

怎样的粘鼠板算是合格的产品呢？由广东省预防控制中心、北京市预防控制中心、吉林省预防控制中心共同起草的GB/T 27780—2011《杀鼠器械实验室效果测定及评价 粘鼠板》标准对粘鼠板产品做出了要求。

1 范围 本标准规定了粘鼠板实验室粘捕鼠类效果试验方法及评价。

本标准适用于粘鼠板实验室粘捕鼠类效果评价。

2 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 2.1有效接触 valid contact

一个时间点，试鼠有三个身体点同时处在粘鼠板的有效粘胶面里。 2.2逃脱 escape试鼠与粘鼠板经有效接触后，不被粘住。

3 试验动物 选择体重180g~220g的标准实验室成年大白鼠作为试鼠，雌雄各半。

4 试验材料 粘鼠板样品,隐蔽箱（不透明,200mm×200mm×300mm）。

5 测试条件 温度：26 ±1 ；相对湿度：60%±5%；测试室面积：3.24m²~9.0m²。

6 操作步骤 6.1将饲料、水和1个隐蔽箱布放在测试室墙根。 6.2将1只试鼠称重后放入测试室。

6.3正常供水、食饵，24h后待其活动正常后，在测试室内沿墙根布放1块粘鼠板。

6.4观察其24h的粘鼠情况。 6.5重复6.1~6.4步操作。整个测试过程需有效接触粘鼠板的试鼠总数不少于30只，记录测试鼠总数、有效接触粘鼠板的试鼠总数、被粘捕的试鼠数和逃脱的试鼠数，计算粘捕率(%)及逃脱率(%)。

7 结果表述 粘捕率按公式(1)计算：

式中：T——粘捕率；S——粘捕试鼠数；M——测试鼠总数。 逃脱率按公式(2)计算：

式中：E——逃脱率；S——粘捕试鼠数；N——有效接触粘鼠板的试鼠总数。

8 评价指标 逃脱率 10%且粘捕率 90%为效果显著。

我们总部实验室卫检所可以做GB/T

27780粘鼠板标准的测试，可以出资质检测报告，有需求的企业可以与我们联系。 联系人：邹工

—— 相关知识 如何更好地用粘鼠板抓到顽鼠呢？粘鼠板的使用效果与产品本身的性能、施工人员的经验以及使用环境所影响。建议：粘鼠板正常布置在老鼠经常出没的鼠路、洞口、墙角、墙边处。一般建议15m²放2~3

张，放在5 -50 的室内。太冷或太热的环境，都会影响粘鼠板粘性使用效果。

如何选择合适的粘鼠板？1、选择正规商品 选择正规的供货商，产品具备官方质量或效果检验报告。

2、胶水含量 选择优质粘鼠板，重点粘胶要求优质，并达到一定的克数（ 40g）；3、足量投放 系统的灭鼠，肯定不能是一个粘鼠板通杀吧？！沿墙角5米位置布放一个粘鼠板，老鼠活动密集点，也要全部布放。

4、布放环境 粘鼠板布置环境要求干燥、清洁，设法避免水、油、粉尘环境。或者可以考虑在鼠板下方，向周围方向布置离鼠板边沿宽度大于500px的保鲜膜，老鼠上板逃脱时可能会带动保鲜膜和粘胶，将老鼠像粽子一样包裹。5、确保粘性 如果鼠板质量不是很好或者鼠板粘胶表面已有粉尘，失去粘性，又无更好的，可以考虑将现有粘鼠板用力合起，直到鼠板两边粘胶充分融合，然后打开，如此开合，多次循环，现有粘鼠板粘性。

6、布放位置 正确规范布置粘鼠板，尽可能将鼠板布置在鼠道上，以增加同一时间点与粘胶接触的鼠类身体部位数，确保鼠类身体更多部位同时接触粘胶，降低鼠的逃脱率。春季来到，气温回暖，为鼠类提供了适宜的繁殖生长条件。开展春季灭鼠防鼠，是降低全年鼠密度的时期，可以有效控制登革热、流行性出血热等虫媒传染病的发生风险。粘鼠板无毒安全环保，非常方便用在家庭、学校、、食品厂、食堂、粮库、仓库、幼儿园等场合。老鼠有许多种类，特点不一样。灭小家鼠，平铺粘鼠板就可以了；灭褐家鼠或者是黄胸鼠，要折叠，将粘鼠板沿虚线折叠成中空的三棱柱，用绳子或扎带保持这个形状，才会有效果。

—— 行业资讯

将绒毛膜促性腺1500~3500单位和25毫升生理盐水混合后，进行肌肉注射。将促卵泡100~200单位和5~10毫升生理盐水混合后，每隔2天肌肉注射1次，3次为一疗程。每隔5天，皮射20毫升胎盘组织液，4次为一疗程。每天肌肉注射10~20毫克己烯雌酚一次，连续注射3次。将手伸入奶牛直肠，然后隔着肠壁抓住卵巢，用拇指在黄体的基部将黄体摘除，同时要注射维生素K，防止出血。“防”养殖场要有严格、完善的防疫程序，严格执行貂场的卫生消毒制度。一定要杜绝任何非本场车辆、人员、畜禽随便进入养殖场。免疫”要根据养殖场的特点和流行现状，制定符合自己养殖场的一套免疫程序，严格执行>。预”养殖场要制定合理有效的预防和方案，尤其是在季节转换、天气不稳定的时候，貂群的抵抗力会降低从而极易引发，应提前做好抗应激处理和增强免疫力。治”养殖场最后的保障就是，毛皮动物如果生病了一定要及时发现，迅速，对于已患有传染病的病体一定要先隔离再。用原料药有的养鸡户认为原料药质量有保证，成本低，好，这是不可取的。养鸡户对于原料药的药性不了解，不要轻易使用原料于鸡病，在

实际生产中不要直接使用原料，要选择厂家生产的成品使用，确保鸡病的效果，减少用药的风险。随意配伍主要表现为养鸡户或兽药经销商不太清楚分类和作用，有时将同一类别的两种或主要作用相同的几种混合；认为几种总比单独使用一种要好，不了解配伍禁忌，随意将几种盲目配伍使用，错误地认为一种差，品种多可以产生累加作用等不规范的配伍使用，结果是配伍不当，剂量过大，不佳，甚至引起家禽中毒死亡。