

GB/T27780-2011杀鼠粘鼠板检测效果及评价及国内测试机构

产品名称	GB/T27780-2011杀鼠粘鼠板检测效果及评价及国内测试机构
公司名称	广东杰信检验认证有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途:销售、质量控制 检测对象:粘鼠板 检测周期:一个月
公司地址	广州市天河区中山大道建工路19号2楼
联系电话	13760668881 13760668881

产品详情

粘鼠板是大众灭鼠常用的捕鼠器械之一，使用方便，而且环保又实惠。粘鼠板之所以使用广泛，究其原因还是因为其十分便捷，任何人都可以使用，不需要专业的只是，只要把粘鼠板打开，放置在老鼠经常出没的地方，用不了多久就会有老鼠自投罗网，而一旦老鼠被粘鼠板粘住，基本上也就宣告了它生命的终结。

怎样的粘鼠板算是合格的产品呢？由广东省预防控制中心、北京市预防控制中心、吉林省预防控制中心共同起草的GB/T 27780—2011《杀鼠器械实验室效果测定及评价 粘鼠板》标准对粘鼠板产品做出了要求。

1 范围 本标准规定了粘鼠板实验室粘捕鼠类效果试验方法及评价。

本标准适用于粘鼠板实验室粘捕鼠类效果评价。

2 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 2.1有效接触 valid contact

一个时间点，试鼠有三个身体点同时处在粘鼠板的有效粘胶面里。 2.2逃脱 escape试鼠与粘鼠板经有效接触后，不被粘住。

3 试验动物 选择体重180g~220g的标准实验室成年大白鼠作为试鼠，雌雄各半。

4 试验材料 粘鼠板样品,隐蔽箱（不透明,200mm×200mm×300mm）。

5 测试条件 温度：26 ±1 ；相对湿度：60%±5%；测试室面积：3.24m²~9.0m²。

6 操作步骤 6.1将饲料、水和1个隐蔽箱布放在测试室墙根。 6.2将1只试鼠称重后放入测试室。

6.3正常供水、食饵，24h后待其活动正常后，在测试室内沿墙根布放1块粘鼠板。

6.4观察其24h的粘鼠情况。 6.5重复6.1~6.4步操作。整个测试过程需有效接触粘鼠板的试鼠总数不少于30只，记录测试鼠总数、有效接触粘鼠板的试鼠总数、被粘捕的试鼠数和逃脱的试鼠数，计算粘捕率(%)及逃脱率(%)。

7 结果表述 粘捕率按公式(1)计算：

式中：T——粘捕率；S——粘捕试鼠数；M——测试鼠总数。 逃脱率按公式(2)计算：

式中：E——逃脱率；S——粘捕试鼠数；N——有效接触粘鼠板的试鼠总数。

8 评价指标 逃脱率 10%且粘捕率 90%为效果显著。

我们总部实验室卫检所可以做GB/T

27780粘鼠板标准的测试，可以出资质检测报告，有需求的企业可以与我们联系。 联系人：邹工

相关知识 春天气温回暖，万物复苏，也是老鼠繁殖生育的旺季，俗语说“一公加一母，一年二百五”，描述的就是老鼠惊人的繁殖能力。春天灭一只鼠等于夏天灭一窝鼠，繁殖高峰之前开展灭鼠，可以起到事半功倍的作用。老鼠有许多种类，特点不一样。灭小家鼠，平铺粘鼠板就可以了；灭褐家鼠或者是黄胸鼠，要折叠，将粘鼠板沿虚线折叠成中空的三棱柱，用绳子或扎带保持这个形状，才会有效果。物理防制鼠类方法主要有粘鼠板法及鼠夹法，鼠夹可应用在室内外各种环境，粘鼠板应放置在室内不受风雨影响的环境内。（一）粘鼠板法。将粘鼠板打开平放在墙角地面或其它有鼠活动的地方。在粘鼠板投放花生米等诱饵。灭鼠时如发现粘鼠板胶出现黏度下降应停止使用，及时更换。

（二）鼠夹法。使用方法与粘鼠板相似，但使用时应避免误伤人和其他动物，远离儿童、活动场所。粘鼠板捕鼠效果不好的原因有多种，主要有以下几个方面：1、粘鼠板的用量和放置位置：如果粘鼠板的用量太少或放置位置不正确，就很难捕获老鼠。一般来说，每十平米放置一张粘鼠板是比较合理的，而且要放在老鼠经常经过和出没的地方，如墙角、门框等。2、老鼠的行动轨迹：老鼠都有固定的行动路线，如果粘鼠板没有放在其经常经过的地方，捕获效果就会大打折扣。因此，在放置粘鼠板之前，先观察老鼠的行动轨迹。3、频繁移动粘鼠板：频繁移动粘鼠板会使老鼠对胶水失去信任，从而避免从粘鼠板上经过。因此，放置粘鼠板后应保持其位置不变，并定期检查。4、粘鼠板的质量问题：如果粘鼠板的质量不好，胶水的粘性不强，就容易让老鼠挣脱。因此，应购买正规厂家生产的粘鼠板，以确保其质量和效果。5、环境因素：如果粘鼠板放置的环境潮湿、多尘或有水，就会影响到胶水的粘性，从而降低捕鼠效果。因此，应将粘鼠板放在干燥、干净的环境中。6、人为因素：在使用粘鼠板的过程中，如果处理不当，如用手直接触碰粘鼠板上的老鼠等，就会破坏胶水的粘性，影响捕鼠效果。

行业资讯 选种选种是通过综合选择，选出符合人们要求的羊只留作种用，同时淘汰不符合要求的个体，或者对其进行改良，以改善和提高羊群品质。3系谱系谱是一只绵羊先代情况的记载，说明其祖先的生产性能和等级情况。4后裔测验后裔测验即通过后代的特征和性能来评定种羊的种用价值。5选配选配指对公、母羊配偶个体的选择，是为了巩固和提高公、母羊的优点，纠正其缺点，从而生产出品质优良的后代。6品系品系指在同一品种内具有某些共同的突出特点，并能将这些特点相对稳定地遗传下去，且个体间有一定程度的亲缘关系、一定数量的群体。治马属动物肠阻塞用米醋250mL、芝麻油500mL、温开水500mL，调匀灌服用。治马属动物胸膜炎用米醋250mL，加凉开水1000mL，隔日灌服，连服4次。凡优质米醋，其醋酸含量均在5%以上，可达20%，如用原液灌服，对家畜的胃肠有很强的刺激性。家畜用米醋内服治病，将其稀释至左右的浓度后使用，才能趋其利而避其

害。同时，醋为酸性液体，切不可用碱性硬水稀释，也不可和碱性同时应用，更不可与碱性混用。检查一只手交叉抓住母鼠肩部以上的颈部、前腿和肋骨外廓，另一只手放于后腿之下，托起整个鼠体，轻摸下腹部角部位，用手指隔着腹壁探摸胚胎，如果发现弹性卵圆形小体，即为。期间饲养密度不宜过大，饲料要充足，保持安静，轻抓轻放，以免造成。鼠产仔前后的护理母鼠产前约1周就少吃多睡，产前1~2天会自动衔草垫窝，产前约1天停食。母鼠产前阴门肿胀、潮红，乳头比平时增大约1倍，能挤出少量的乳汁时，预示其半天之内就要产仔，因此要及时做好产仔准备工作。