

葡萄膨大剂--果美丰

产品名称	葡萄膨大剂--果美丰
公司名称	山东国润生物农药有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东 泰安
联系电话	15315332738

产品详情

葡萄保果膨大剂果美丰使用说明

保花保果 膨大增产 果粒均匀 果柄柔软 提前成熟 提高品质 产品性能：

- 1、新栽幼树使用果美丰(300-500倍)能显著增加生长量，使其提早进入丰产期；
- 2、春季新梢萌芽后使用果美丰(500-1000倍)，能促进枝条和花序健壮生长,增厚叶片，增大果穗；
- 3、膨大果粒，减少落（掉）粒，葡萄着色好、硬度大、穗形好、商品性极佳；
- 4、果粒大小均匀，避免大小粒现象；
- 5、使用果美丰无穗轴硬化现象，葡萄耐贮耐运，商品性提高；
- 6、嫁接上使用果美丰（稀释100-200倍），能促进伤口愈合，提高接穗成活率，增加接穗生长量。

使用方法：1、保花保果 对于难坐果的品种，花末期稀释1000倍喷施花穗或沾花穗。同时达到无核的效果。 保果要确定合适的用药时间，在保证坐果量的同时避免坐果量太大

，避免疏果的麻烦。（如果坐果量太大,要及时疏果。）

有核品种花期保果,会无核化。（如果要避免无核，花后5天以后用药）

2、膨果 稀释300-500倍 花后15-20天(黄豆粒大小时,红提、维多利亚花生米大小时)喷果穗或浸果穗一次；间隔10-15天再用药一次（视情况而定,如夏黑 以及无核处理的葡萄建议膨大2次）。 注意事项：

- 1、配药要用干净的中性水，随配随用，配好的药液不能放置过夜。
- 2、施药器械雾化要好、一定要洗干净，禁止使用打过除草剂的器械。
- 3、严禁与其它农药、调节剂及化肥混用。
- 4、避免太阳光太强及高温时用药,傍晚5时后施药效果最佳。
- 5、使用本品应水肥充足，用药后立即灌水施肥，提高效果。
- 6、易裂果品种严禁使用。
- 7、使用本产品随着果实的增大，裂果的可能性也在加大，请慎重选择使用。
- 8、严格控制土壤水分（包括雨水等），土壤水分过大，特别是接近成熟期，裂果可能性加大。
- 9、阴凉干燥处避光、避火保存。
- 10、避免药液接触人体。用药时要穿防护服及戴防护面具，药液触及人体立刻清洗并就医。
- 11、蘸果穗时，应注意蘸前先抖动果穗，使败育果粒落掉，蘸果3秒后，再抖一次果穗，将积在果粒上的药液抖落。
- 12、提前采取预防措施避免出现僵果、大小粒现象。

qq605622272 tel:15315332738 e-mail:lgwjx@163.com