

荷兰进口香水百合种球绿色百合花球根花卉球根植物百合种子

产品名称	荷兰进口香水百合种球绿色百合花球根花卉球根植物百合种子
公司名称	沭阳林洲花木园艺场
价格	面议
规格参数	品种:百合 主要观赏部位:观叶 叶色色系:绿色系
公司地址	沭阳县新河镇新槐村兴庄组14号
联系电话	15250721080

产品详情

百合是百合科百合属多年生草本球根植物，主要分布在亚洲东部、欧洲、北美洲等北半球温带地区，全球已发现有百多个品种，中国是其最主要的起源地，其中55种产于中国。近年更有不少经过人工杂交而产生的新品种，

如：亚洲百合、麝香百合、香水百合、葵百合、姬百合等。

植物名：百合花学名/拉丁名：lilium 英文名字：lily 别名：强瞿、番韭、山丹、倒仙、百合蒜 科学分类：界：植物界 plantae 门：被子植物门 magnoliophyta 纲：单子叶植物纲 liliopsida 目：百合目 liliales 科：百合科 liliaceae 属：百合属 lilium 简述：百合花（学名：lilium）是百合科百合属多年生草本球根植物，原产于地球北半球的几乎每一个大陆的温带地区，主要分布在亚洲东部、欧洲、北美洲等，全球已发现有110多个品种，其中55种产于中国。近年更有不少经过人工杂交而产生的新品种，如：亚洲百合、麝香百合、香水百合、葵（火）百合、姬百合等。百合花主要用来观赏，尤以荷兰及日本输出的切花品种居多。百合花的球根含丰富淀粉质，部份更可作为蔬菜食用，在中国，食用百合具有悠久的历史，而且中医认为百合性微寒平，具有润肺，清火，安神的功效，花、鳞状茎均可入药，是一种药食兼用的花卉。栽培管理（一）生长期内施肥1~2次，百合片需要的肥料n-p-k的比例应是5:10:10，每平方施用量为30克，栽前还可施蹄角粉（每平方米50克）、骨粉（100克）和硫酸钾（30克）。（二）追肥的用量氮肥每平方米15克，磷肥每平方米45克（过磷酸钙或粗骨粉），钾肥每平方米15克或草木灰每平方米120克。（三）生长期的管理用支柱缚扎，防止倾倒炎热夏季用腐叶土、碎蕨表面覆盖显蕾前，施骨粉、草木灰炎热干旱，灌溉、松土科学繁殖繁殖百合花可用播种法，鳞片扦插法，子球繁殖法等。（一）播种繁殖1.采收种子：百合授粉后10~15天，子房开始膨大，经60~150天果成熟开裂前即可采收。2.第二年春，气温超过30℃时播种3.播种土用二份肥沃

壤土，一份粗砂和一份泥炭土，每立升中加入过磷酸盐 1 克。4．播种后根据发芽的快慢覆土，6 个月后即可开花。（二）鳞片扦插 1．鳞片扦插不受季节限制，待鳞茎老熟掘出 3～4 年鳞茎，放置通风处吹干，剥下肥大鳞片。2．木制的沙床、浅盆内将鳞片插入 2/3～4/3，插后保温遮阳，经 45～120 天后可形成小鳞茎。（三）子球繁殖法 1．当接近地面的茎节长出小子球，小心摘下。2．每个子球可繁殖一株植株。 警

告 部分百合是有毒性的，所以，即使作为药用也要严格按照医生的医嘱使用。品种情况：百合为多年生草本。无皮鳞茎扁球形，乳白色。茎直立，地下茎节有茎生根，地上茎刚直矮壮、绿色光滑。叶散生多数，披针形。花顶生数朵，喇叭形，平展，花被先端稍向外反卷，乳白色，花被筒深处淡绿色。

本产品的品种是百合，主要观赏部位是观叶，叶色色系是绿色系，花色色系是多色系，花型是单瓣，花期是 2-3（月），果期是 5（月），株高是 30-35（cm），地径/蓬径是 1（cm），品种纯度是 99（%），品种来源是国外引进种，光照习性是喜阳，干湿习性是喜湿，生长适温是 15（ ），是否耐寒是否，是否做一二年生栽培是否，园林用途是切花材料,花境,花坛,花带，病虫害是无，分类是家庭园艺用种球，盛花期是多季