

多肉植物盆栽珍珠吊兰佛珠吊兰绿色植物盆栽桌面植物

产品名称	多肉植物盆栽珍珠吊兰佛珠吊兰绿色植物盆栽桌面植物
公司名称	沭阳县新河镇金浪花卉苗木园艺场
价格	面议
规格参数	品牌:金浪花木 品种:珍珠吊兰 株高:10（cm）
公司地址	沭阳县新河镇新槐村蔡庄组
联系电话	86-052783391436 13851350755

产品详情

注意啦：珍珠吊兰和佛株吊兰一棵5-15厘米左右带根。 不能接受的亲慎拍！

1 基本介绍

中文学名： 珍珠吊兰 珍珠吊兰

界： 植物界

门： 被子植物

纲： 双子叶植物

科： 兰科

属： 吊兰

2 形态特征

珍珠吊兰，一粒粒圆润的、肥厚的圆心形叶片，似一串串风铃在风中摇曳，这就是它的叶子。因叶互生，较疏，圆心形，深绿色，肥厚多汁，极似珠子，故有佛串珠、佛珠、绿葡萄、绿之铃之美称。还有人称它为佛珠吊兰、情人泪。

珍珠吊兰的学名叫翡翠珠，菊科千里光属多年生常绿匍匐生肉质草本植物。茎纤细，全株披白色皮粉。头状花序，顶生，长3~4厘米，呈弯钩形，花白色至浅褐色。花期：12月至翌年1月。

3 生物习性

栽培中浇水应宁干勿湿，这是成功的关键之一。天气干燥时可以多向叶、蔓喷水以弥补水分的不足，保持珠体的青翠饱满。较喜半阴，暴烈晒可能灼伤珠体，光线过弱则生长不强。

4 栽培技术

珍珠吊兰性喜富含有机质的、疏松肥沃的土壤。在温暖、空气湿度较大、强散射光的环境下生长最佳。忌荫蔽、忌高温高湿

栽培珍珠吊兰的培养土，可用腐熟的牛粪与椰糠按4:6配制而成，或疏松的腐叶土亦可。夏季应避免高温、高湿，否则极易烂茎死亡，可将盆花置于防雨荫蔽内栽培；入秋后，植株恢复生长，应增加光照，并追施液肥。

珍珠吊兰主要受：蜗牛、蚜虫、吹绵蚧和煤烟病、茎腐病的危害。

珍珠吊兰在栽培中注意以下几点即可生长良好:

1.由于叶肉质，多汁，故耐旱。栽培中浇水应宁干勿湿，这是成功的关键之一。天气干燥时可以多向叶、蔓喷水以弥补水分的不足，保持珠体的青翠饱满。较喜半阴，暴晒可能灼伤珠体，光线过弱则生长不强。

2.植株根系很浅，可浅盆栽植。一般用瓦片垫底孔，并铺上一层煤渣或粗沙以增加透气和滤水性(尤其是现在常用的塑料盆栽植的情况下)，土壤最好用腐叶土
(秋冬树木的落叶拌入一定量的碎土露於阎冒肽曛烈荒县纯捎?拌入一定沙子(土、沙比约为1:3左右)。

3．性喜温暖湿润，较耐寒(江淮地区栽培时可耐0 的低温)，耐高温，最适温度为20 ~28 左右。高温和低温时都生长缓慢，尤其是30 以上的高温环境中几乎休眠，应少浇水施肥，否则易烂根--这也是栽培成功的关键之一。

4．生长旺盛的春秋季应"薄肥勤施"，常在叶面喷施1-3‰的氮肥和磷酸二氢钾有利于使珠体更加翠绿肥大，提高观赏价值。

5．很少有病虫害，春季蚜虫是其一，及时抹去或喷1500倍氧化乐果杀灭；夏秋季的螨虫为次，需用1000倍三氯杀螨醇杀灭。注意通风和增加叶面湿度，可减少感染螨虫。

6．可扦插繁殖。枝蔓极易生气生根，可于春秋剪下几节，一半埋入沙子或疏松的土中，保持湿润但不积水，很快就会生根以供栽植(春秋季约半月，而冬夏则不易生根，遇盆株不够均匀丰满却生长过长的情况时，就可以采用这种措施予以弥补。)

4.1 繁殖方法

珍珠吊兰采用扦插繁殖。将枝蔓剪成8~10厘米一段，平铺半埋于盆土中，开始时保持50%~60%的湿度，半个月后即可生根成活。成活后要控制浇水量，保持盆土干湿相间的状态，有利于植株生长。

4.2 养护方法

珍珠吊兰继承了菊科的特点，春秋季节生长期对水分需求量巨大，水分足够的情况下生长迅速。夏季对闷湿的环境特别敏感，所以要依靠通风、遮阴、控水等措施来度夏。

如果发现土表面的茎部有腐烂枯萎现象，不要犹豫立即剪掉，对健康的枝条简单修剪后重新扦插。基本上是不需要阳光直射的，特别是夏季，一定不要晒。浇水除了夏季和冬季要注意外，春秋季节使劲灌吧！土壤比例上，颗粒质料可以多一点，更加利于根系呼吸及生长。根系生长非常快，花盆最好使用深一点的花器，深度15cm左右的花器最好。[1]

4.3 培养土比例

在盆栽花卉中，培养土的配制比例如下。一般花草：腐殖质土30%、园土50%、河沙20%；木本花卉：腐殖质土40%、园土50%、河沙10%；播种用土：腐殖质土50%、园土30%、河沙20%；温室花卉：腐殖质土40%、园土40%、河沙20%等。

培养土一般多以腐殖质土和菜园土作为基本材料，再配合其他物质配制而成。其他物质主要有山泥或塘泥、糠灰、黄沙、火屑、厩肥等。此外，还有瓦片、破盆片，用于盆底垫孔以利排水通气。腐殖质土制作方法比较简单，一般按自己培植盆花多少准备泥盆、缸或在室外泥地挖坑，底部放入一层菜园土，再将日常的一些生活垃圾如菜皮、瓜果皮、豆麦皮及各种鲜嫩草、树叶等植物残渣放在园土上面，同时放入鸡鸭等家禽粪便，浇一些淘米水、鱼腥水或人畜粪尿水，上面再加一些菜园土，这样一层土一层肥水堆积多层，盆口或坑口加盖（泥土也可以）封住。经过2至3个月的发酵腐熟后，取出在太阳下曝晒，便成了良好的腐殖质土。一般情况下，这种土必须充分腐熟才好使用。腐殖质土是大部分盆栽花卉上盆和翻盆的主要用土。菜园土即普通的栽培土，因经常施肥耕作，肥力较高，富含有机质，团粒结构好，是培养土的主要成分。用作栽培月季、石榴及草花效果良好。缺点是表层易板结，通气透水性差，不易单独使用，而应掺入一些其他成分配制后使用。

4.4 制作堆肥土

在大量需要培养土栽培花卉时，制作堆肥土也是一种切实可行的办法。它利用枯枝、落叶、青草、果皮、粪便、毛骨等为原料加上换盆旧土、炉灰、园土共同堆积，往上面浇灌人畜粪水，最后再在四周和上面覆盖园土。经过4至5个月的贮放让其发酵腐烂，然后打碎过筛即为肥土。堆肥土与沙土各一半混合使用，既肥沃又利于排水，如用堆肥与泥炭土混合种兰花、山荷花、君子兰、米兰、杜鹃等花木，效果很好。

4.5 培养土配方

现将常见盆栽花卉培养土配方介绍如下。用于文竹、吊兰的培养土，要求排水透气性能好，宜用园土或塘泥60%、沙10%、糠灰30%配制；用于梅花、海棠、石榴等花木的培养土，用腐殖质土35%、塘泥35%、沙15%、糠灰15%配制后加少量骨粉；用于茶花、含笑、杜鹃等的培养土，可选用腐殖质土或山泥、焦

泥灰、沙配制而成的腐殖质土40%、山泥30%、焦泥灰10%、沙20%配制后，再加少量骨粉等；用于菊花、大丽花和一般温室草花等培养土，用腐殖质土30%、塘泥40%、园土30%配制以后，再以上述混合物的70%加糠灰30%，加少量骨粉、石灰等混合，使土壤酸碱性适中；用于柏树、南天竹一类的培养土，用山泥45%、腐殖质与焦泥灰35%、沙20%配制而成；室内观叶植物培养土，用2份泥炭、1份蛭石、1份珍珠岩或采用1份泥炭、1份珍珠岩、1份树皮配制即可。

5 园艺用途

珍珠吊兰用小盆悬吊栽培，极富情趣，一粒粒圆润、肥厚的叶片，似一串串风铃在风中摇曳，是家庭悬吊栽培的理想花卉。

本产品的品牌是金浪花木，品种是珍珠吊兰，株高是10（cm），直径是0（cm），株形是球形，园林用途是盆栽,景观植物，繁殖方式是扦插