

# 朝天椒种子 阳台庭院种植盆栽蔬菜水果辣椒籽 家庭种菜

产品名称	朝天椒种子 阳台庭院种植盆栽蔬菜水果辣椒籽 家庭种菜
公司名称	沭阳县新河镇葱艺花卉园艺苗木场
价格	面议
规格参数	品种:辣椒 级别:原种 品种纯度:98.0(%)
公司地址	江苏 沭阳县 新河镇大营村张西组
联系电话	86-025783392761 15252899236

## 产品详情

品名：朝天椒直播或移栽：均可可否连续采摘：可播种温度:15-25° 生长温度:15-32° 生长期:约90天最佳播种季节:春秋播（春夏秋可播）

### 蔬菜档案

名称：朝天椒(南韩朝天椒) 品种介绍：椒形美丽，朝天，嫩果绿色，熟果红色，色彩艳丽，辣味浓，椒长4-6厘米，宽约0.9厘米，结果能力强。对气候要求：喜温暖气候，不耐阴，喜肥，在土层深厚，疏松，肥力好的土壤栽培有利生长及延长采收期。

### 蔬菜名称：朝天椒

科属：茄科，辣椒属 种子处理：育苗前晒种2-3天，以提高发芽率和发芽势。然后将种子放入55℃温水中，不停搅拌，待水温降到30℃时停止搅拌，加水浸泡7-10小时后取出，洗掉黏液，沥干水待播。  
播种育苗：一般在3月中下旬阳畦育苗或露地育苗，以延长采收期，提高产量。播前苗床浇足底水，每平方米播种量6-8克，播后覆土2厘米，随后撒毒饵防治地下害虫，最后在床土表面盖薄膜增温保湿。齐苗后揭掉地膜，苗龄45-60天移栽。

培育壮苗 朝天椒宜大苗栽植，苗龄以60~70天为宜。为了保证苗壮，应采取阳畦或小弓棚育苗。春椒可在2月下旬开始育苗，麦茬椒应在3月下旬育苗。苗床土应散碎肥沃，这是培育壮苗的关键。如施用化肥，每平方米15厘米厚的苗床土掺入氮磷钾三元素（各含16%）复合肥0.2公斤，硼、锌肥5克，另加0.5公斤草木灰。苗床土配制后进行消毒，每平方米15厘米厚的苗床土掺入50%的多菌灵可湿性粉剂20克，或70%的甲基托布津可湿性粉剂20克，可防治立枯病、炭疽病。为了防治地下害虫，每平方米15厘米厚的苗床土掺入2.5%的敌百虫可湿性粉剂100克，能杀死蝼蛄、蛴螬等。播种前将种子暴晒2~3天，然后用10%的高锰酸钾水溶液浸泡15分钟，再捞出冲洗干净，即可播种。播种后，应对苗床增温，即把地膜封严，提高土壤温度，白天温度控制在20℃，夜晚温度控制在10℃，10天左右即可出苗。应把苗育足，春

椒每栽1亩应育苗20平方米，需种子150克，麦茬椒每栽1亩应育苗25平方米，需种子250克。苗出土后，应及时放风排湿，防止苗旺长，苗棚内白天温度控制在25 ~ 30，夜晚温度控制在15 ~ 20。由于早春自然光较弱，苗棚内光照普遍不足，应于晴朗的中午前后揭膜，增加光照强度，抑制苗徒长。另外，移栽前15天，应控制肥水，加大放风量，进行炼苗、蹲苗，防止出现高脚苗、旺长苗。

整地施肥：选地势高燥、能灌能排的沙壤土地块种植。结合整地每亩施优质土杂肥5000公斤，过磷酸钙30公斤。土杂肥不足的用三元复合肥代替。定植

一般在4月中下旬至5月上旬移栽，麦茬椒在麦收后移栽。移栽行距40-50厘米，株

距20-30厘米，每穴栽两株。朝天椒喜湿怕水，宜选择保肥、松散通气的壤土、沙壤土或黏壤土。土壤的pH值以6.5~8为宜。每亩可施充分腐熟的优质农家肥3~5立方米，或氮磷钾三元素（各含16%）复合肥50

~80公斤，可根据土地肥力适当增减。为了便于排灌，应采用高畦栽培，畦宽0.6~1米（栽2~3行），畦与畦之间沟宽0.2米，畦的垂直高度为0.2米，这样雨大时可及时排水，天旱时只浇沟中，保持畦面疏松透

气，有利苗生长发育。为了通风透光，畦宜取南北方向。定植前对苗床浇一次透水，促进苗生发新根，以便于起苗。起出的苗应随起、随栽、随浇定苗水，为了促进苗早发快长，可在定苗水中加入速效化肥

，每亩用尿素4公斤，磷酸二氢钾2公斤，溶入1500公斤水中。管理：定植时浇透水，特别是麦收后气温高，应浇透水，过几天再轻浇缓苗水。缓苗至开花坐果期适当控水，以提高地温，促进根系发育，防止

徒长。开花坐果后加大浇水量。盛果期每半个月追施尿素一次。每次每亩施10-15公斤，促高产防早衰。生长中后期喷施0.3%磷酸二氢钾液2次，防病增产。生长期多次培土壅根，防渍防倒伏。红透鲜亮的椒

可分次采摘，也可以一次采摘。（一）中耕培土。及时中耕培土，可促进朝天椒根系生长发育，提高土壤温度，有利保墒。土壤水分较多时，中耕还可散湿，有利根系生长。（二）追施肥料。春椒如基肥充

足，可根据植株长势适当追肥。追肥对麦茬椒特别重要，可适当早追肥，在底肥充足的前提下，可追施碳酸氢铵50~60公斤，过磷酸钙50~60公斤，硫酸钾20~30公斤。如进行叶面喷肥更好，可喷0.3%的氮

磷钾三元素（各含16%）复合肥水溶液50~60公斤，生育期可喷3~5次。（三）浇水排水。朝天椒根系浅，怕旱怕涝，特别是盛果期，如缺水，产量会严重受影响。应小水勤浇，保持土壤湿润。高温天气忌

中午浇水，以免降低土壤温度，造成落叶、落花、落果。（四）摘心打顶。朝天椒枝型层次明显，一为主茎果枝，二为侧枝果枝，三为副侧枝果枝。其主要产量为副侧枝的果实组成，因此，主茎一现蕾应进

行人工摘心，促发侧枝。副侧枝若发生晚，果实不能成熟，应及时摘除。防治病虫：病害主要是病毒病和炭疽病。病毒病由蚜虫传播，从苗期开始要定期防治蚜虫。病毒病发病初期选用高锰酸钾、萘乙酸、

植病灵、病毒a或小叶敌喷雾防治。炭疽病选用50%甲基托布津、百菌清或乙磷铝防治。害虫主要有棉铃虫和烟青虫，选用辛硫磷或除虫菊酯类药剂防治，确保红椒上无虫眼。（一）病害。危害朝天椒的病

害有碎倒病、立枯病、病毒病、疫病等，应及早防治，且要坚持防重于治的原则。7~8月为疫病多发阶段，每7~8天喷一次药，可选用多菌灵、百菌清等进行喷施。（二）虫害。主要有棉铃虫、烟青虫和玉

米螟等，可用高效氯氰菊酯3000倍液或凯撒乳油5000倍液等进行喷施。平时要勤查细看，要在虫少且小时防治。天气干旱时要注意防治红蜘蛛、蚜虫等。

本产品的品种是辣椒，级别是原种，品种纯度是98.0（%），净度是97.0（%），发芽率是98.0（%），半斤是38，1公斤是145，1斤是75