

98元起批云水间健康美味蔬果

产品名称	98元起批云水间健康美味蔬果
公司名称	宜兴市飞龙苗木种植基地
价格	面议
规格参数	新奇创意项目:不报名
公司地址	江苏 宜兴市 宜兴市宜城街道人民北路65号（内办公楼）
联系电话	86-051087923977 13921315136

产品详情

榉树（别名血榉、金丝榔、沙榔树、毛脉榉等）又名大叶榉，是榆科榉属的乔木树种，属国家二级重点保护植物。在中国分布广泛，生长较慢，材质优良，是珍贵的硬叶阔叶树种。

栽培技术编辑播种育苗
种子采集

母树选择

根据选用目的分别选择结实多、籽粒饱满的健壮母树采种。

榉树

- （1）培育用材林，母树要求树形紧凑、树体高大、干形通直、枝下高较高、旺盛且无病虫害。
- （2）培育园林绿化品种，母树要求树冠开阔、树体丰满、叶色季相变化丰富、色叶期较长；变色期早。
- （3）盆栽观赏类型，母树要求树体矮小，树形奇异。

采种时间与采种方法

10月下旬至11月上旬，当果实由青转褐色时采种。采用自然脱落法或敲打小枝法在地面收集种子。采种后要先除去枝叶等杂物，然后摊在室内通风干燥处自然干燥2~3d，再行风选。贮存前于室内自然干燥5~8d，使种子含水量降到13%以下。[2]

圃地选择

育苗圃地宜选地势平坦整地作床有水源浇灌，且土层深厚肥沃的沙壤土或轻壤土立地。播种前，苗圃地要深翻细耕，清除杂草，施足基肥（2000~2500kg/hm²饼肥）。圃地细耙整平后，筑成宽120cm、高20~25cm的苗床。

播种

插种可在晚秋和初春进行。秋播随采随播，翌春3月上中旬发芽，种子发芽率和出苗率高，苗木生长期长；但易受鸟兽危害。春播宜在雨水至惊蛰时播种，最迟不得迟于3月下旬。苗床播种后加盖遮光率50% - 75%的遮阳网有利于保湿和后期苗木管理。播种量为150~200kg/hm²保持土壤湿润，以利种子萌发。

苗期管理

条播，行距20cm，覆土厚度0.5cm，并盖草浇透水。插种后25~30d，种子发芽出土，应及时揭草炼苗，并防治鸟害。幼苗期需及时间苗、松土除草和灌溉追肥。苗木生长高峰期在7月至9月下旬。苗期每年应除草3 - 5次，每次松土除草后追肥1次，最后1次施肥可在8月上旬进行。榉树苗期苗木会出现分杈，需及时修整。[2]

苗木栽植

立地选择榉树栽植应选择平原、滩地、沟坡、四旁等土层深厚、疏松、肥沃土壤，排水良好的立地环境，切忌排水不良，易季节性积水、淹水的立地。

整地

栽植前要将土地深耕、耙平，并施足基肥。确定好株行距，放线开沟筑畦挖穴。穴的大小视苗木根系体积大小而定。一般穴的大小应是苗木根系体积的2~3倍为宜。

初植密度

1年生榉树实生苗移植50cmx150cm（13000株/hm²）。

栽植方法

定植株行距为100cmx100cm（10000株/hm²）或栽植宜在3月上、中旬进行。栽植时将苗木在穴中放正，先回土至穴1/3处，再将树苗干向上轻提，使根系舒展，再回土至穴2/3处。尔后，浇透水，再将穴土回满。回土时先回表土，再回心土，并做到边回土边轻踩。一年生苗木栽植宜浅。在长江以南岗坡旱地，栽植深度为树苗原根茎埋入土中0~4cm。在夏季地下水位较高的立地宜筑垄栽植。干旱地区和易旱地块，栽植深度可以略深，根茎埋入土中5~10cm。栽植时，还需在树根际四周做好围堰，方便持续干旱时浇水，并防止”下雨时雨水流失。对个别地上部分已枯死、但根部还存活的苗木，应及时截干平茬。[2]

密度调控

苗木定植2年后，要隔行起苗移植。通过隔株留苗、密度调控，扩大苗木的生长空间，株行距调整为100cmx200cm（5000株/hm²）或100cmx150cm（6700株/hm²），移植过程中需注意苗木的保湿。以后，每年根据立地条件、培育目标（市场规格要求）对密度进行动态调整。苗龄3年的苗木株行距调整为200cmx200cm（2500株/hm²）或200cmx300cm（1700株/hm²）；苗龄5年的苗木应调整为200cmx400cm（1200株/hm²）、200cmx300cm（1700株/hm²）；苗龄7年的苗木调整为400cmx400cm（600株/hm²）、400cmx600cm（400株/hm²）。通过合理的密度调控，保障树体良好发育，培育良好树形，提高绿化苗木应用品质。[2]

价格可联系李总13222832228或者留言

本产品的新奇创意项目是不报名