6-苄氨基嘌呤（6-苄基腺嘌呤 6-苄胺基嘌呤 6-BA 162714-86-5）

产品名称	6-苄氨基嘌呤（6-苄基腺嘌呤 6-苄胺基嘌呤 6-BA 162714-86-5）
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	类别:6—苄基氨基嘌呤 有效成份含量:98（%） 酸度≤:1（%）
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街
联系电话	18086432516

产品详情

6-苄氨基嘌呤

产品名称：	6-苄氨基嘌呤; 6-(n-苄基)氨基嘌呤
英文名称：	benzyladenine;n-benzyl-adenine; 6-benzylaminopurine; n-(phenylmethyl)-1h-purin-6-amine; benzyl(purin-6-yl)amine
cas号：	1214-39-7
分子量：	225.25
分子式：	c12h11n5
结构式：	
外观：	白色结晶
含量：	≥99%

6-苄氨基嘌呤,6-苄基腺嘌呤 6-ba理化性质：白色晶状粉末，熔点230-233°C，沸点237-246°C，可溶于甲醇、丙酮、异丙醇，难溶于水、己烷等。常温下储存稳定。纯度：99%包装：1kg/袋*25kg/桶苄氨基嘌呤是细胞分裂素类植物生长调节剂，可经植株的茎、叶果实、花、芽等吸收。具有促进细胞分裂和细胞增大、增长，诱导种子发芽和休眠芽的生长；抑制核酸和蛋白质分解，延缓组织衰老；打破顶端优势，促进侧芽萌发，提高坐果率等功能。一．功能作用1、打破顶端优势，促进侧芽生长。于苹果、梨、蔷薇、洋兰及茶树等顶端生长旺盛阶段，用100mg/l苄胺基嘌呤全株喷洒，可促进分枝。2、保花保果、提高坐果率。苄胺基嘌呤在花期或生理落果前喷施，可防止葡萄、柑橘、苹果、瓜类等生理落果，提高坐果率。3、促进果实膨大。苄胺基嘌呤能促进柑橘、苹果、枣、桃、草莓等果实快速生长，成熟后果实色泽好，品质也得到显著提高。4、保绿保鲜，延长蔬菜贮藏期。于绿叶蔬菜采收前后用10-20mg/l苄胺基嘌呤喷洒一次，可减缓叶绿素分解速度，延长存放期。5、提高结实率，增加千粒重。于水稻、玉米等灌浆期喷施全株，可促进光合产物向籽粒转运，促进灌浆结实。二．注意事项1、苄氨基嘌呤针对不同作物的施用浓度差异较大，施用时应先小规模应用再大面积推广。2、苄氨基嘌呤用于保花保果、提高单果重等多种用途时，与赤霉素混用具有较好的增效作用。3、苄氨基嘌呤在植物体内移动性小，用于保果、膨果时，采用浸果或喷果处理效果更好。三．公司服务1、免费提供试验样品，相关农药以及肥料的技术资料。2、

提供苄氨基嘌呤原药的使用技术。

6-苄氨基嘌呤

产品名称： 6-苄氨基嘌呤; 6-(n-苄基)氨基嘌呤英文名称： benzyladenine;n-benzyl-adenine; 6-benzylaminopurine; n-(phenylmethyl)-1h-purin-6-amine; benzyl(purin-6-yl)aminecas号： 1214-39-7分子量： 225.25分子式： c12h11n5结构式：外观： 白色结晶含量： ≥99%

生产剪影

生产区

实验综合楼

过滤干燥洗涤机

双锥回转混粉器

炭纤维废气吸附装置

原料仓库

合成车间

精烘包车间1

精烘包车间2

精烘包车间3