

# 松子 生松子 天然松子 绿色食品

产品名称	松子 生松子 天然松子 绿色食品
公司名称	蓝田县诚成苗木有限公司
价格	面议
规格参数	品种:松子 等级:A级 净仁率 :98 ( % )
公司地址	蓝田县辋川镇官上村三组12号
联系电话	13572138628 15802926132

## 产品详情

地理分布 为中国特有树种，产于山西（吕梁山、中条山、太行山）、河南西部、陕西秦岭、甘肃南部及天水麦积山、四川北部江油观雾山及湖北西部等地。分布于太行山南部、中条山、吕梁山、秦岭、小陇山、岷山、大巴山、伏牛山及熊耳山、神农架等山地。河南交界的大松岭、甘肃小陇山、四川江油观雾山等处均有野生纯林。苏州、杭州、衡阳等地均有栽培。经济价值 可供房屋建筑、家具、文具等用材；种子可食；树姿优美，树皮白色或褐白相间、极为美观，为优良的庭园树种。纹理直，轻软，加工后有光泽和花纹，供细木工用。其树姿优美，树皮奇特，可供观赏。园林用途 干皮斑驳美观，针叶短粗亮丽，是一个不错的历史园林绿化传统树种，又是一个适应范围广泛、能在钙质土壤和轻度盐碱地生长良好的常绿针叶树种。孤植、列植均具高度观赏价值 繁育栽培 白皮松为常绿乔木，幼树树皮平滑，灰绿色，老树树皮不规则脱落后露出粉白色内皮，衬以青翠的树 白皮松冠，十分美观。同时，白皮松对二氧化硫及烟尘的污染有较强的抗性，早已成为华北地区园林绿化的优良树种。近年来由于大规模白皮松苗木供不应求，培育壮苗大苗已成为工作重点。 选好圃地白皮松幼苗怕涝，育苗地要选平坦、有排灌条件的地块。重粘土地、盐碱土地、低洼积水地不宜作育苗地。精细整地，育苗地要深翻整平耙细，施足底肥，如腐熟的圈肥、堆肥。也可将过磷酸钙与饼肥或土杂肥等混合使用，效果更好。整地前每亩撒施10公斤硫酸亚铁粉末，翻入土中进行杀菌消毒。土地整好后，做成南北向畦田，畦埂高25厘米，畦宽1米，以备播种。 白皮松 种子催芽处理白皮松种子要用波尔多液浸种消毒，播前用温水(50 至60 )浸种催芽或混沙层积催芽，咧嘴种子数达到种子总数的50%时即可播种。这样出苗壮且整齐，一般在15至20天即可出土发芽。 播种播种一般在土壤解冻后10至15天(3月下旬至4月初)为最好。播前畦面浇透水，每10平方米播种1至1.5公斤，可产苗1500株左右，采用宽幅条播或撒播。播后盖细沙土1至1.5厘米，每亩用扑草净125克加25%的可湿性除草醚250克对水25公斤，用喷

雾器洒在苗床上除草。最后在畦面上搭小拱棚增温保湿，提高出苗率，出苗前不用浇水。因老鼠爱吃松子，在搭拱棚盖薄膜前，要往畦面上撒些老鼠药。 苗期管理待幼苗出齐后，逐渐加大苗床通风时间，通过炼苗增强其抗性。白皮松喜光，但幼苗较耐荫，去掉薄膜后应随即盖上遮阴网，以防高温日灼和立枯病的危害。 白皮松 久旱不雨或夏季高温要及时浇水。除草要掌握除早、除小、除净的原则，株间除草用手拔，以防伤害幼苗。撒播苗拔草后要适当覆土，以防裂缝。条播苗除草和松土结合进行，间苗和补苗同时并举。而后要及时排水。 白皮松幼苗应以基肥为主，追肥为辅。从5月

中旬到7月底的生长旺期进行2至3次追肥，以氮肥为主，追施腐熟的人粪尿或猪粪尿每亩3担，加水20担左右，腐熟饼肥每亩5至15公斤对成饼肥水15担左右，每亩施尿素4公斤左。生长后期停施氮肥，增施磷、钾肥，以促进苗木木质化，还可用0.3%至0.5%磷酸二氢钾溶液喷洒叶面。白皮松幼苗生长缓慢，宜密植，如需继续培育大规格大苗，则在定植前还要经过2至3次移栽。两年生苗可在早春顶芽尚未萌动前带土移栽，株行距20至60厘米，不伤顶芽，栽后连浇两次水，6至7天后再浇水。4至5年生苗，可进行第二次带土球移栽，株行距60至120厘米。成活后要保持树根周围土壤疏松，每株施腐熟有机肥100至120公斤，埋土后浇透水，之后加强管理，促进生长，培育壮苗。病虫害防治，种蝇播种后要注意种蝇幼虫为害幼苗，所施基肥必须充分腐熟，捣碎。松大蚜为害苗木嫩枝和针叶，易招致黑霉病，造成树势衰弱，甚至死亡。防治方法：可在为害初期喷50%的辛硫磷乳剂，每公斤加水2000公斤。文化喻义白松张著 叶坠银钗细，花飞香粉乾。寺门烟雨里，混作白龙干。

本产品的品种是松子，等级是A级，净仁率 是98（%），杂质 是3（%），水分 是17（%），产地/厂家是陕西蓝田辋川乡