

# 家居室内盆栽植物 四季陆续开花 茉莉花盆栽 双色茉莉 花苗

产品名称	家居室内盆栽植物 四季陆续开花 茉莉花盆栽 双色茉莉 花苗
公司名称	沐阳景通花木场
价格	面议
规格参数	品种:茉莉花 落叶与否:常绿性 地径:00 ( cm )
公司地址	沐阳县颜集镇堰下村方庄组61号 ( 住所 )
联系电话	052783396195 13815717242

## 产品详情

### 双色茉莉

又名鸳鸯茉莉、五色茉莉、番茉莉。由于开花有先后，在同一植株上同时能看到不同颜色的花，故得名“双色茉莉”，其英文名之意为“昨天、今天、明天”，这形象地描绘出其花色的特殊变化。小花初开时深蓝色（昨天），后变为浅紫色（今天），最后变成白色（明天）。

#### 产地习性

原产中美和南美。双色茉莉性喜阳光充足、温暖湿润的气候环境，需排水良好的微酸性土壤，适宜的生长温度为20~30℃之间。12℃条件下进入休眠期状态，冬季室温不能低于13℃。

华东、华北地区作温室盆栽，要求排水良好的微酸性土壤，生长适温18~30℃。室内栽培至少要有4小时的光照，在充足的日照条件下开花繁茂。12℃条件下进入休眠。

#### 3形态特征

双色茉莉属多年生常绿小灌木，株高可达1米。

叶片长卵形，暗绿色。花单生或几朵密生，花被具5浅裂，好似5瓣梅花，花冠直径3~4厘米，花初开时呈淡紫色，逐渐变成青色，最后变成白色。

4花期一年开两次

双色茉莉一年开花二次，第一次在早春，花多而香；第二次在金秋十月，花较少。

若管理得好，花可从3月~10月，每月开一次，花具芳香，颇受人们的喜爱；若管理不当，一年中仅春季开1~2次花。

鸳鸯茉莉还有一位姐姐叫大花鸳鸯茉莉（*brunfelsia calycina* benth.），其树形、叶子、花都比鸳鸯茉莉大，因此每年10-12月繁花似锦、艳丽无比。一年开花多次

### 盆土要适宜

（1）要了解它的生长习性，以创造适合其生长的环境。鸳鸯茉莉性喜温暖、湿润气候，喜光照，喜肥，不耐涝，不耐强光直射，喜半阴、通风的环境，耐寒性不强。

（2）盆土要适宜。宜用疏松、肥沃、透气、排水良好且富含腐殖质的微酸性土壤。一般用腐叶土1份、园土1份、木屑或煤渣灰1份，也可用园土2份、煤渣灰1份、加少量的饼渣混合而成。切忌使用碱性土壤。

（3）浇水要适量。鸳鸯茉莉喜湿润，不耐涝。日常浇水应掌握“见干见湿”的原则。夏季气温高，空气干燥，除盆土浇足水外，每日用净水向叶面喷雾2~3次，并向其周围洒水，以增加空气湿度，降低气温。冬季应控制浇水，保持盆土偏干；雨季防止盆内积水。最好每次花谢后，待新梢长到3厘米左右时控制浇水，以促使花芽分化，以利于每月都开花。

（4）施肥要合理。生长季节每次花谢后，追施1次稀薄饼肥水，10天后追施1次以磷、钾为主的液肥，并结合浇水向叶面喷施0.2%~0.3%磷酸二氢钾，促使花芽分化。再则，生长期须施二次薄矾肥水，以防土壤碱化，叶片发黄。夏季施肥水肥比为9:1。在11月进房前要喷施1~2次同浓度的磷酸二氢钾，提高其抗寒能力，利于安全越冬。冬季停止施肥。

（5）光照适宜和通风良好。喜光照、半阴、通风良好的环境，不耐强光直射，抗风力较差，清明前后出室后放向阳避风处培养。夏季置于通风凉爽处或遮光50%的荫棚下管理，防止阳光直射，否则叶片易发黄、发焦。

（6）及时修剪。花期过后要修剪整枝，以保持优美株形。在每次花谢后，及时剪去残花，并将一些长的枝条剪去1/3~1/2，促使萌发更多的分枝，使树形紧凑、美观，以利下月开花多；在秋末最后一次花谢后，进行重剪，即每枝留2~3芽，其余剪除，并将瘦弱枝、内向枝、病虫枝剪除，以利来年春季长势旺、枝冠双色茉莉

美、开花多。

（7）防冻。鸳鸯茉莉耐寒力差，冬季须在冷室栽培。一般11月中旬左右入室，室温保持在0℃以上，控制浇水，保持盆土偏干，就能安全越冬。若要使其冬季开花，应提高室温，使夜间温度达到15℃以上，给予充足的光照，继续施肥和浇水，即能如愿以偿。

（8）防病治虫。鸳鸯茉莉春季有蚜虫危害，如通风不良、闷热，也有介壳虫、红蜘蛛危害。病害偶有叶斑病、白粉病。如发现有害虫，用40%氧化乐果乳油1000倍液喷杀；病害则喷多菌灵或甲基托布津500~800倍液防治。

5栽培管理播种繁殖

选种：播种前首先要对种子进行挑选，种子选得好不好，直接关系到播种能否成功。

1、最好是选用当年采收的种子。种子保存的时间越长，其发芽率越低。

2、选用籽粒饱满、没有残缺或畸形的种子。

3、选用没有病虫害的种子。

**消毒：**消毒包含两个概念，一个是指对种子进行消毒，另一个是指对播种用基质进行消毒。家庭对种子消毒常用60℃左右的热开水浸种一刻钟，然后再用温热水催芽12~24小时。对播种用的基质进行消毒，最好的方法就是把它放到锅里炒热，什么病虫都能烫死。

**催芽：**用温热水（温度和洗脸水差不多）把种子浸泡12~24个小时，直到种子吸水并膨胀起来。对于很常见的容易发芽的种子，这项工作可以不做。

**播种：**对于用手或其它工具难以夹起来的细小的种子，可以把牙签的一端用水沾湿，把种子一粒一粒地粘放在基质的表面上，覆盖基质1公分厚，然后把播种的花盆放入水中，水的深度为花盆高度的1/2~2/3，让水慢慢地浸上来（这个方法称为“盆浸法”）；

对于能用手或其它工具夹起来的种粒较大的种子，直接把种子放到基质中，按3×5公分的间距点播。播后覆盖基质，覆盖厚度为种粒的2~3倍。播后可用喷雾器、细孔花洒把播种基质质淋湿，以后当盆土略干时再淋水，仍要注意浇水的力度不能太大，以免把种子冲起来；

**播种后的管理：**在深秋、早春季或冬季播种后，遇到寒潮低温时，可以用塑料薄膜把花盆包起来，以利保温保湿；

幼苗出土后，要及时把薄膜揭开，并在每天上午的9：30之前，或者在下午的3：30之后让幼苗接受太阳的光照，否则幼苗会生长得非常柔弱；大多数的种子出齐后，需要适当地间苗：把有病的、生长不健康的幼苗拔掉，使留下的幼苗相互之间有一定的空间；当大部分的幼苗长出了3片或3片以上的叶子后就可以移栽。

#### 光照管理

喜欢半荫环境，在秋、冬、春三季可以给予充足的阳光，但在夏季要遮荫50%以上。放在室内养护时，尽量放在有明亮光线的地方，如采光良好的客厅、卧室、书房等场所。在室内养护一段时间后（一个月左右），就要把它搬到室外有遮荫（冬季有保温条件）的地方养护一段时间（一个月左右），如此交替调换。

#### 肥水管理

对于盆栽的植株，除了在上盆时添加有机肥料外，在平时的养护过程中，还要进行适当地肥水管理。

**春、夏、秋三季：**这三个季节是它的生长旺季，肥水管理按照“花宝”——清水——“花宝”——清水顺序循环，间隔周期大约为1~4天，晴天或高温期间隔周期短些，阴雨天或低温期间隔周期长些或者不浇。

**冬季：**在冬季休眠期，主要是做好控肥控水工作，肥水管理按照“花宝”——清水——清水——“花宝”——清水——清水顺序循环，间隔周期大约为3~7天，与其他季节一样需按天气调整。

对于地栽的植株，春夏两季根据干旱情况，施用2~4次肥水：先在根颈部以外30~100公分开一圈小沟（植株越大，则离根颈部越远），沟宽、深都为20公分。沟内撒进25~50斤有机肥，或者1~5两颗粒复合肥（化肥），然后浇上透水。入冬以后开春以前，照上述方法再施肥一次，但不用浇水。

**修剪：**在冬季植株进入休眠或半休眠期，要把瘦弱、病虫、枯死、过密等枝条剪掉。也可结合扦插对枝条进行整理。

**换盆：**只要养护得法，它就会生长很快，当生长到一定的大小时，就要考虑给它换个更大的盆，以让它继续旺盛生长。换盆用的培养土及组分比例可参照上盆培养土。

**脱盆：**把要换盆的花放在地上，先用巴掌轻拍盆的四周，使根系受到震动而与盆壁分离，把花盆倒过来放在左手上，左手的食指与中指轻轻夹住植株，手腕与指尖顶住盆沿，右手拍打盆底，再用拇指从底孔把根土向下顶，让植物脱出来。脱出来后，用双掌轻轻拍打盆土，让多余的土壤脱落。

**花盆准备：**选一适当大小的花盆，盆的底孔用两片瓦片或薄薄的泡沫片盖住，既要保证盆土不被水冲出去，又要能让多余的水能及时流出。瓦片或泡沫上再放上一层陶粒或是打碎的红砖头，作为滤水层，厚约2~3公分。排水层上再放有肥机肥，厚约1~3公分，肥料上再一薄层基质，厚约2公分，以把根系与肥料隔开，最后把植物放进去，填充营养土，离盆口约剩2~3公分即可。

**栽培要点**

鸳鸯茉莉。喜温暖，湿润气候，不耐寒。要求阳光充足、排水良好酸性壤土。冬季需在室内过冬，春季移至室外。

培养土可用园土：腐叶土：砗糠灰（1.5：1：0.5），适当加厩肥配制。春季翻盆时适当修剪整枝，修去老根、枯枝、密枝、徒长枝。夏季需移人大树下培养。

春季后可渐加大浇水量，夏季可2天浇透1次水。适当喷水于叶面及周围环境，秋季减少浇水次数。冬天一般10天浇1次，浇水过多，室内太湿会导致落叶或根部腐烂。

春夏季每隔10~15天施1次薄饼肥水（20%），秋开始停止施肥，防止新梢长出受冻害。

**繁殖。**a.扦插繁殖可在4~8月间，剪取一年生枝条，8~10厘米长，插后1个月便可生根。夏季用全光照喷雾法成活率高。b.亦可用压条法繁殖，枝条在15厘米处刻伤，埋入土中，3周后便可生根，50天可离体成苗移栽。

**鸳鸯茉莉黄叶怎么办？**

- 1、水黄。由于长期浇水引起的叶黄，表现在嫩叶阳黄无光泽，老叶则无明显变化，根细小黄绿，新梢萎缩不长，应节制浇水，重者可脱盆，放荫凉处晒干土后再重新上盆。
- 2、旱黄。由于缺水或浇水偏少而引起叶片发黄。老叶自下而上枯黄脱落，但新叶一般生长正常。应适当加大浇水量和浇水次数。
- 3、肥黄。由于施肥过多或浓度过大，新叶顶尖出现干褐色，老叶尖干焦枯黄脱落，一般叶面虽然肥厚有光泽，但大都凹凸不平。应停止浇肥或用清水淋洗肥份。
- 4、缺肥黄。盆花长期只浇水不浇肥，或多年不换盆，根须结成一团，植株得不到肥分，使叶发黄，除及时换盆外，平时应薄肥勤施。
- 5、灼黄。喜阴湿的盆花和观叶植物，如吊兰、万年青、一叶兰、玉簪竹芋等，如经强烈阳光直射，叶片常出现黄尖，应放阴处。
- 6、碱黄。喜酸性土的花卉，如杜鹃、栀子、山茶、桂花、白兰等，如盆土或水质偏碱，常引起叶片由绿转黄，甚至脱落，除用酸性营养土栽培，可使用矾肥水或0.2%-0.5%的硫酸亚铁水溶液喷施，既可使叶子由黄变青。
- 7、湿热黄。一些不耐高温，高湿的花卉，因夏季炎热，通风不良，避阴不当而引起的发黄。如倒挂金钟、杜鹃在闷热潮湿的环境中有此现象，要注意通风和降温，而盆土不能过温。

8、白化黄。花卉长期光照不足，叶片中的叶绿素减少，使叶片绿色渐渐消失，呈现出白化病，可将植株移到阳光充足的地方，使叶片慢慢变青。

9、在寒冷的冬季，如室内温度低，有些怕冷花卉，如白兰、广东万年青、一品红叶子也会变黄，脱落。此外，受病虫危害的花卉也能引起黄叶而脱落。如植株下部有少数叶片变黄脱落，那属正常。

本产品的品种是茉莉花，落叶与否是常绿性，地径是00（cm），土球直径是0（cm），树龄是2（年），栽培环境是露地，树形是丛生形，园林用途是花坛、灌丛，主要观赏部位是观花，株高是35-50（cm），蓬径是15-20（cm），0是0