

常年供应藤本三角梅盆栽三角梅重瓣大苗5年苗量大优惠价格

产品名称	常年供应藤本三角梅盆栽三角梅重瓣大苗5年苗量大优惠价格
公司名称	沭阳县新河镇金浪花卉苗木园艺场
价格	面议
规格参数	品种:三角梅 地径:1 (cm) 分枝数:2-3 (枝)
公司地址	沭阳县新河镇新槐村蔡庄组
联系电话	86-052783391436 13851350755

产品详情

所售宝贝均以实物为标准，要求完美的亲慎拍

三角梅

b 为本词条添加义项名

?

三角梅是叶子花属（学名：bougainvillea）植物的统称，又名九重葛、三角花、叶子花、叶子梅、毛宝巾、纸花、南美紫茉莉、贺春红等，紫茉莉科，南美紫茉莉属，原产于秘鲁、阿根廷、巴西、南美等地。三角梅为常绿攀缘状灌木，喜温暖湿润气候，不耐寒，喜充足光照，常用于绿篱、庭园花木等。

基本信息

中文学名

三角梅

亚目

石竹亚目

拉丁学名

bougainvillea spectabilis willd

科

紫茉莉科

别称

九重葛、三叶梅、毛宝巾、籐杜鹃、三角花

界

植物界

属

叶子花属

门

被子植物门

种

三角梅

纲

双子叶植物纲

分布区域

中国、巴西、秘鲁、阿根廷

目

石竹目

目录

展开

1 基本信息2 形态特征3 生长习性4 分布范围5 品种分类5.1 普通三角梅5.2 光叶三角梅5.3 杂交三角梅6 栽培相关6.1 繁殖6.2 栽培要点6.3 造型6.4 催花6.5 病虫害防治7 盆栽要点

1 基本信息

三角梅

中文学名：三角梅

拉丁学名：bougainvillea spectabilis wind

别称：九重葛、三叶梅、毛宝巾、簕杜鹃、三角花、叶子花、叶子梅、纸花

界：植物界

门：被子植物门

纲：双子叶植物纲

目：石竹目

科：紫茉莉科

属：叶子花属

2 形态特征

三角梅为常绿攀援状灌木。枝具刺、拱形下垂。枝叶生长茂盛，叶腋常有刺，亦有无刺之品种。单叶互生，卵形全缘或卵状披针形，被厚绒毛，顶端圆钝。

花顶生，花很细，小，黄绿色，常三朵簇生于三枚较大的苞片内，花梗与药片中脉合生，并没有很明显的花瓣，小花为小漏斗的形状，是其花被，是个保护花蕊的组织，花瓣内有七、八枚雄蕊与一枚雌蕊，虽然有少部份会结种子，不过绝大部份都不会结果，所以繁殖方法还是以扦插繁殖法为主。

花苞大而明显，苞片卵圆形，为主要观赏部位，颜色有鲜红色、橙黄色、紫红色、乳白色等。可分为单瓣、重瓣以及斑叶等品种。

3 生长习性

喜温暖湿润气候，不耐寒，耐高温，怕干燥。在3℃以上才可安全越冬，15℃以上方可开花。

喜充足光照。对土壤要求不严，在排水良好、含矿物质丰富的黏重壤土中及排水良好的砂质壤土生长良好，耐贫瘠、耐碱、耐干旱、忌积水，耐修剪。

三角花对水分的需要量较大，特别盛夏季节，水分供应不足，易产生落叶现象，直接影响植株正常生长或延迟开花。如土壤过湿，会引起根部腐烂。三角花属喜旋光性植物，如光线不足或过于荫蔽，新枝生长细弱，叶片暗淡。

三叶梅属藤蔓生，繁殖简单。只需要在初春或者晚秋用它的茎杆扦插于土壤内，一个月就能生根，长出

枝叶。第二年就能开花。花期很长，一般一月左右。叶子花花期较长，花多且美丽，在南方一般花期为当年的10月份至翌年的6月初。开花期间落花、落叶较多，需及时清除，即保持清新美观。

三角梅

4 分布范围

三角梅三角梅原产于南美洲的巴西、秘鲁、阿根廷。在20世纪50年代，大陆南方各省的植物园和北方大城市的展览温室内逐步大量引种栽培三角梅，全国各地普遍栽培，并广泛用于室内阳台、窗台和公共场所点缀等园林布置，三角梅亦成为各地一种深受市民喜爱且广泛应用的观赏花木。中国各地均有栽培。同时是海南省省花；广西的北海市和梧州市；福建的厦门市；广东的深圳市、珠海市、惠州市和江门市；贵州的黔西南州州花以及台湾的屏东、日本的那霸市，等国内外十多个城市的市花。

5 品种分类

5.1 普通三角梅

藤本，叶片大，茎与叶有褐色细毛，叶片先端园钝，苞片椭圆状卵形，腋生刺在顶端显著外弯，开花时会落叶；花顶生或腋出。其品种包括：白色三角梅、红色三角梅、砖红三角梅、朱锦三角梅、艳红三角梅、艳紫斑叶三角梅、金黄三角梅、紫红重瓣三角梅、双色三角梅。

5.2 光叶三角梅

攀援灌木，茎粗壮，分枝下垂，幼枝与嫩叶初有微毛，不久即光滑无毛。有腋生直刺，叶卵形或卵状披针形，先端急尖或渐尖，上面无毛，花多散生在枝上。比较耐寒，还很爱开，花多花密，枝条也密。花的颜色浅一点，株型漂亮植株矮小，紧凑，适合盆栽。

其品种包括：橙色三角梅、白色三角梅、亮叶三角梅、鸳鸯三角梅、艳紫三角梅、斑叶三角梅、光叶斑叶三角梅、茄色三角梅、艳紫重瓣三角梅、柠檬黄色三角梅。

5.3 杂交三角梅

*bougainvilleabutiana*为*b.glabra*和*b.peruviana*（秘鲁三角梅）的杂交种，是三角梅中的珍品。花苞集生于枝条先端，原有的花萼和雄蕊退化，变成与花苞同色的薄片，小而重叠似绣球，花期长。

包括的品种有：怡红三角梅、怡锦三角梅、黄锦三角梅、西施三角梅、紫凤三角梅、紫鹃三角梅、橙红三角梅、黄金三角梅、红锦三角梅、皱叶深红三角梅。

6 栽培相关

6.1 繁殖

常用扦插繁殖。6--7月花后剪取成熟的木质化枝条20厘米长，插入沙床，一般30天左右生根。温度过低，生根慢，成活率低。如用iba或naa处理，有促进生根的作用，浓度一般为100--200毫克每升，处理时间10--20秒。

6.2 栽培要点

三角梅露地栽培。选择阳光充足的空旷地或窗台南面。对水分需要量较大，特别是盛夏季节，如水分供应不足，易产生落叶现象，直接影响到植株的正常生长或延迟开花。因此，夏季和花期浇水应及时，花后浇水可适当减少。

生长期保持土壤过湿也会引起落叶和根部腐烂。生长期每周施肥一次，花期增施2--3次磷肥。花期落花，落叶较多，应及时清理。

花后需修剪整形，将枯枝，密枝去除，加强肥水管理，促使萌发新枝。树势恢复后，又通过控肥控水，促使花芽分化，达到四季开花，年年开花的目的。生长茂盛，根系很快长满全盆，故每隔1--2年需换盆，换盆时盆底加入基肥。盆栽用土以园土，腐叶土和沙各一份混合。栽培5--6年，需重剪更新。[3]

栽培过程中要经常摘心，以形成丛生而低矮的株形。也可设支架，使其攀援而上。三角梅属喜光植物，无论在室内或露地栽培，都要放置或栽培在阳光充足的地方。春天发芽前进行换盆，夏季和花期要及时浇水，花后应适当减少浇水量，日常浇水以“间干间湿”为原则。生长缓慢期施1次肥，在旺盛生长期半个月施1次肥，花期增施几次磷肥。开花期落花、落叶较多，要及时清理，保持植株整洁美观。花后进行整形修剪，调整树势，将枯枝、密枝、病弱枝及枝梢剪除，促生更多茁壮的新枝，保证开花繁盛。大约5年左右可以重剪更新1次。冬季要控制浇水，使植株充分休眠，则来年春夏开花会更加花繁色艳[2]。

三角梅1.温度：生长适温为15-30，在夏季应适当遮荫或采取喷水、通风等措施，冬季应维持不低于5的环境温度。

2.光照：一年四季除新上盆的小苗应先放于半阴处。冬季应摆放于南向窗前，且光照时间不能少于8个小时。

3.水分：春秋两季应每天浇水一次，夏季可每天早晚各浇一次水，冬季应控制浇水花蕾出现后每天早晚各浇水一次，同时向叶面喷水1-2次。梅雨季节要防积水以免植株烂根死亡。

4.土壤：三角花喜疏松肥沃的微酸性土壤，忌水涝，

5.肥料：除在盆土中施足基肥外，生长季节还应追肥。入少量的磷酸二氢钾，同时给叶面喷施0.1%-0.2%的磷酸二氢钾溶液，盛花期每周浇施1次矾肥水，叶面喷施0.2%的磷酸二氢钾。

6.整形修剪：叶子花生长势强，因此每年需要整形修剪，

7.花期控制：若想国庆节见到叶子花，可提前将盆放于暗室进行避光处理，因其为短日照花卉。时间在8月初左右，将盆栽叶子花置于不漏光的环境中，每天从下午5点开始至第2天上午8点完全不见光，

注意：1. 炎夏和冬季因植株生长缓慢或休眠，应停止施肥。2. 勿施浓肥或生肥。

6.3 造型

1、花篮型：即是将花修成大平面的前提下，在花平面的对角处，各留一条500-600mm长的枝条，将枝条轻轻向内弯曲，在100-200mm处重叠，绑扎在一起，形成一个花篮的提梁。此为花篮型。

2、多塔型：将所有的侧枝剪出，只留一条或三条向上直立的枝条，若留三条须帮扎或编在一起，待其长到理想的高度，剪掉顶尖，使之萌发侧芽，按400-500mm的间隔，清除多余的芽，形成多塔型。

3、悬崖型：就是采用绑扎方式，使部分枝条下垂，状如悬崖，称悬崖型。

6.4 催花

全花式：即全树皆花。催花方法是，提前45天追施1:1:1的复合肥后，进行控水，叶片蔫萎后，再加少量水，结合叶面喷雾。如此反复，直至叶片全部脱落后，浇透水。这时生出的，便会满树是花。这过程必须在全日照下进行三角梅的整形修剪，新栽小苗长出5-6片叶时，要及时摘去顶芽，保留下部的3-4片叶；新抽枝条长出5-6片叶时，进行第二次的摘心（即摘去顶芽），如此反复几次，可形成丰满的树冠。已开花的大植株，一年可进行2次修剪，第一次结合早春换盆，从基部剪去过密枝、纤细枝、病虫枝，同时缩剪徒长枝，对保留的枝条也要进行短截。第二次在花谢后，酌情疏枝、剪去枯枝、弱枝、内堂枝，保留的枝条在30厘米处截去顶梢，同时将所有的侧枝剪短，促使多发新枝，形成更多的花芽。生长衰弱的大龄老株，可行重剪，即每个大枝仅保留基部的2-3个芽，其余全数剪去，促成植株更新复壮。

6.5 病虫害防治

常有叶斑病为害，用百分之六十五代森锌可湿性粉剂600倍液喷洒。

害虫有刺蛾和介壳虫为害，用百分之零点二五敌杀死乳油5000倍液喷杀。

7 盆栽要点

三角梅三角梅别名叶子花[1]，原产巴西，在我国各地均有栽培。喜温暖、阳光充足的环境，茎弯曲并密生绒毛。单叶互生、卵形、被厚绒毛，顶端圆钝。花生于新梢顶端，常3朵簇生于3枚较大的苞片内，花梗与苞片中脉合生。苞片叶状，椭圆形，鲜红色，也有白色、砖红及橙色等品种。花被管密生柔毛，雄蕊5至10枚，子房1室，花期6至12月。南方暖地常用作棚架、篱垣等绿化材料，也可作盆栽观赏。根据江苏花农和技术人员的实践经验，现将促其盆栽花期长、花色艳的三条关键措施简述如下：

一是科学管水。即浇水、控水、重浇水三点结合。初夏生长季节，每天浇一次水，保证枝叶生长。6至7月，根据不同品种适当控水3至4次，控水程度为使枝梢和叶片稍萎蔫。这时每天向叶片喷水1至2次，待2至3天后浇透水。反复控水几次或隔天浇水，可促进花芽分化。当新梢出现花蕾时，每天早晚各浇一次重水，并向叶面喷水1至2次。10月后视土壤的干湿程度适当浇水。冬季入室后，保持不干不浇，浇则浇透。

二是施肥得当。三角梅开花多，花期长，养分消耗多，加上盆土有限，一定要定期补充肥料。春季换盆时，施足基肥，根据花盆大小，每盆施10至15克腐熟鸡粪干或饼肥，入室后追施速效氮肥。生长旺盛期，每隔7天施腐熟饼肥水，加速花芽分化。当叶腋出现花蕾时，可多施肥、施大肥，以磷钾肥为主。夏季盛花期，每3至5天施一次矾肥水，每7天喷0.3%磷酸二氢钾。8至10月更要大肥大水，以肥代水，用矾肥水或饼肥水浇施。

三是日照要长、光照要强。盆栽三角梅，只要光、温、水、肥满足，一年四季都可开花。每天日照10至12小时，光照强、通风条件好，花期可达到180至200天。其中紫色三角梅可开到春节，清明出室后，五一节又可鲜花怒放。

欢迎实地考察、万亩花木直销、竭诚为您服务

江苏省沭阳县金浪花木园艺场座落于中国花木之乡-----沭阳县新河镇。205国道，京沪高速公路，新长铁路穿越境内，交通极为便利。

本场立足本镇10万亩花卉苗木产业规模,实行公司+农户的经营方式，本场多年来，曾多次被评为“沭阳县明星企业”,重合同，守信誉”企业。

本基地主要供应：

绿篱色块类：

龙柏、金叶女贞、大叶黄杨、小叶黄杨、红叶小檗、红叶石楠、金叶菴、红帽月季、黄帽月季、丰花月季、洒金柏、剑麻、红叶女贞、水腊、蔷薇、迎春、连翘、金丝桃、海桐、石榴、红天竹、雪松、蜀桧、地柏、扶芳藤、木绣球等。

花卉盆景类:

桂花、腊梅、木香、金桔、牡丹、含笑、玉兰、米兰、红枫、棕竹、蓝天竹、佛肚竹、五针松、佛手、发财树、红梅、贴梗海棠、垂丝海棠、日本海棠及各式树桩山水盆景等。

行道树类：

高杆女贞、樱花、紫荆、紫薇、广玉兰、白玉兰、紫玉兰、黄玉兰、银杏、法桐、紫叶桃、碧桃、木瓜、国槐、垂槐、黄金槐、垂柳、金丝柳、栾树、白腊、合欢、水杉、紫叶李、木槿、江南槐、棕榈等。

草坪、草籽类:

马尼拉、百慕达、黑麦草、高羊茅、早熟禾、剪股颖、四季青、狗牙根、三叶草、百喜草、弯叶画眉草、马蹄筋、日本结缕草、葱兰草、红花炸浆草、常夏石竹等。

观赏竹类：

刚竹、金镶玉竹、箬竹、青皮竹、翠竹、早园竹、慈孝竹、佛肚竹、毛竹、雷竹、四季竹、紫竹、佛肚竹等。

果树类：

核桃、桃树、李树、板栗、石榴、樱桃、葡萄、苹果、猕猴桃、枣树、山楂树、无花果、柿树、杏树、草莓、树莓、蓝莓、橘子等。

本产品的品种是三角梅，地径是1（cm），分枝数是2-3（枝），树龄是3（年），园林用途是棚架绿化，墙体绿化,地被，主要观赏部位是观花，花色色系是多色系，花期是10---6（月）