

环嗪酮除草剂25% 除杂树 除杂竹 使用广 出口品质 水剂 250ml

产品名称	环嗪酮除草剂25% 除杂树 除杂竹 使用广 出口品质 水剂 250ml
公司名称	沭阳县新河镇土茹花木园艺场
价格	面议
规格参数	有效成分:环嗪酮 有效含量 :25 (%) 生产厂家:江苏蓝丰生物化工股份有限公司
公司地址	江苏 沭阳县 江苏沭阳县新河镇
联系电话	86-18761109470

产品详情

江湖人称：

植物杀手一点红

除草除树除竹的小李飞刀

专业：灭生性队除杂剂，对绿色植物几乎没有选择性，目前还没有发现杀不死的植物！

权威：全国林业除草技术推广委员会推荐产品，也是目前唯一有效杀灭杂竹类的药剂方便：杀灭杂树杂草，轻轻一撒问题就解决长效：一次用药可以维持180天至365天，最长可达1095天安全：成品毒性比食盐还低，对人畜安全，对环境友好。经济：用药成本仅是人工砍的10~20%，甚至更低！

环嗪酮与其它除草剂的区别

其它除草剂（正常使用浓度）	环嗪酮（正常使用浓度）
只除草，不能杀树	能除草，也能杀树
不能杀灭竹子	能杀死竹子，而且特效
有些除草剂杀不死根	草死，根也死
一般没有封闭或封闭很短	封闭时间长长，达365天以上
大多数只能对水喷雾	可以撒施，也可以喷雾
下雨不能用药	雨季也可以施药，下雨用药效果更好

使用时间：

适宜季节是3-8月份多雨多雾天气，药剂要靠水分溶解才能渗入地下，也才能让根吸收。用药后5天内下雨，或下雨后1-3天内使用最好。小雨、中雨、大雨前用药都行，最好避免暴雨前使用，以防止药剂被冲走。如果不下雨，土地湿润也可以用药，但是用量要适当加大。

药效说明：

一般杂草2至3周见效

灌木1个月见效

大乔木及竹子要2至3个月见效

乔木与竹子两三个月黄叶掉叶后会重新长出畸形小叶，重复三次左右这样现象就枯死。中文名称：环嗪酮

英文通用名：hexazinone

中文别名：林草净;威尔柏;3-环己基-6-二甲氨基-1-甲基-1,3,5-三嗪-2,4-二酮;3-环己基-6-(二甲氨基)-1-甲基-1,3,5-三嗪-2,4-(1h,3h)-二酮

cas 编号：51235-04-2

分子式：c₁₂h₂₀n₄o₂

分子量：252.31

结构式：

水溶性：3.3 g/100 ml

外观：纯品为白色结晶固体

熔点：115-117

蒸气压：2.7 × 10⁻³pa (25)、8.5 × 10⁻³pa (86)

相对密度：1.25。

毒性：对人畜低毒

大鼠急性经：口ld₅₀>1690毫克/公斤

健康危害：对眼睛有严重刺激作用，对皮肤无致敏作用，在慢性毒性试验中未见异常。对鱼类及鸟类低毒。

剂型：25%水可溶剂、10%颗粒剂。

特点：是内吸选择性除草剂，植物根、叶都能吸收，主要通过木质部传导，对松树根部没有伤害，是优良的林用除草剂。药效进程较慢，杂草1个月，灌木2个月，乔木3-10个月。

适用范围：适用于常绿针叶林，如红松、樟子松、云杉、马尾松等幼林抚育。造林前除草灭灌、维护森林防火线及林分改造等，可防除大部分单子叶和双子叶杂草及木本植物黄花忍冬、珍珠梅、榛子、柳叶绣线菊、刺五加、山杨、木桦、椴、水曲柳、黄波罗、核桃楸等。

使用方法：

1.造林前整地(除草灭灌)使用：东北林区在6月中旬至7月中旬用药，用喷枪喷射各植树点。灌木密集林地用3毫升/点，可用水稀释1-2倍，也可用制剂直接点射。20-45天后形成无草穴。

2.幼林抚育使用：6月中下旬或7月上旬用药，平均每株树用药0.25-0.5毫升，用水稀释4-6倍喷雾。

3.消灭非目的树种：在树根周围点射，每株10cm胸径树木，点射8-10毫升25%水溶剂。

4.维护森林防火道：每公顷用25%水可溶剂6l，对水150-300公斤喷雾。个别残存灌木和杂草，可再点射补足药量。

5.林分改造：可用飞机撒施10%颗粒剂，除去非目的树种。

注意事项：1.最好在雨季前用药。

2.对水稀释药液时，温度不可过低，否则药剂溶解不好，影响药效。

3.使用时注意树种，落叶松敏感，不能使用。

用药经验技巧：

施药到植物根部可吸收的地方

乔木在滴水线附近，最好挖浅坑埋药

特别是地面有较多有机质，比如干草、干树叶等铺于地面，一定要清理、拨开让药

能直接施到土中，在春天小雨季节施药效果好，让雨水慢慢淋溶药剂而有效发挥效果

注意事项：

开药、取药、况药、撒药、喷药，按农药施用要求戴口罩和手套；用药后用肥皂洗手；土地严重干旱并长时间不下雨的，基本无效；不得用于农田或者经济林；部分人皮肤接触药剂后会发红发热，一般用肥皂清洗后要缓解；误服请催吐并及时就医；地块用药后半年内，不宜种庄稼。

本产品的有效成分是环嗪酮，有效含量是25(%)，生产厂家是江苏蓝丰生物化工股份有限公司，剂型是乳剂