

# 出售苗圃专用 果尔除草剂 果儿 美国进口 100毫升/可用2亩地

产品名称	出售苗圃专用 果尔除草剂 果儿 美国进口 100毫升/可用2亩地
公司名称	沐阳国祥苗木园艺场
价格	面议
规格参数	有效成分:100毫升 有效含量 :见说明(%) 用量:40-50毫升(g/ha)
公司地址	江苏沐阳县颜集镇沙湾村圩东组07
联系电话	086 0527 83396760 13357849952

## 产品详情

国祥园艺场提醒您，请阅读后购买，使用方法]

- 1.防除大豆、花生田杂草：在播苗前施药，每亩用24%果尔乳油40-50毫升，加水40-50升喷雾施于土壤。
- 2.防除棉田杂草：在播后苗前或移栽前按剂量对水40-50升喷雾。施药剂量因栽培方式不同而不同：苗床剂量为每亩24%果尔乳油12-18毫升；覆膜田剂量为每亩24%果尔乳油18-24毫升；直播田剂量为每亩24%果尔乳油36-48毫升；移栽田剂量为每亩24%果尔乳油40-90毫升。沙质土用低药量，壤质土、粘质土用较高药量。
- 3.防除大蒜田杂草：大蒜播种后至立针期或大蒜苗后2叶1心期以后、杂草4叶期以前，避开大蒜1叶1心至2叶期，每亩用24%果尔乳油48-72毫升，加水40-50升喷雾，地膜大蒜每亩用24%果尔乳油40毫升，对水40-50升喷雾。
- 4.防除洋葱田杂草：直播洋葱2-3叶期，每亩用24%果尔乳油40-50毫升；移栽洋葱在移栽后6-10天(洋葱3叶期后)，每亩用24%果尔乳油67-100毫升，对水40-50升喷雾。
- 5.防除果园、茶园杂草：在杂草4-5叶期，每亩用24%果尔30-50毫升，加水30-40升，用低压喷雾器作定向喷雾。
- 6.针叶苗圃除草：播种后立即进行土壤处理，每亩用24%果尔乳油50毫升，加水40-50升喷雾。

1.果尔虽然在水稻上取得登记，但从对作物安全角度考虑，北方地区不宜在水稻上使用。

2.果尔为触杀型除草剂，喷药时要求均匀周到，施药剂量要准。采用定向喷雾时，应避开果树、林木，以免造成药害。

3.初次使用时，应根据不同气候带，先经小规模试验，找出适合当地使用的最佳施药方法和最适剂量后，再大面积使用。

4.果尔施用剂量随土质和旱涝情况作相应调整，沙质土用低药量，壤质土、粘质土用高药量。

5.重点防除牛繁缕、苍耳等石竹科或菊科杂草，应在杂草子叶期施药；防除小旋花应在杂草6-8叶期施药；防除看麦娘、野燕麦等禾本科杂草，应在杂草1-2叶期施药。

6.果尔在播后采用土壤处理时，要求土表湿润，但不能积水。应避免翻动土壤表层，以保持药膜层完整。覆膜田遇高温时，应注意揭膜降温，防止产生药害，当温度低于6℃时，禁止使用果尔。

7.在大蒜1叶1心至2叶期施用果尔，易造成心叶折断或严重灼伤，此期间严禁施用。2叶1心期后施用果尔，大蒜叶片出现褐色或白色斑点，对中后期生长无影响。白皮蒜比紫皮蒜对果尔的耐药性强。

美国进口除草剂 - 果尔，登记为大蒜、花生、棉花、水稻、甘蔗、花木、森林苗圃的一年生杂草。其为广谱触杀性除草剂，持效期长，杀草更彻底，安全性更高。

【防治对象】龙葵、苍耳、藜、马齿苋、田菁、曼陀罗、柳叶刺蓼、酸模叶蓼、篇蓄、繁缕、苘麻、反枝苋、凹头苋、刺黄花稔、酢浆草、锦葵、野芥、粟米草、千里光、苧麻、辣子草、看麦娘、硬草、一年生甘薯属、一年生苦苣菜等。

本产品的有效成分是100毫升，有效含量 是见说明（%），用量是40-50毫升（g/ha），用途是除草，生产厂家是国祥园艺场代销，剂型是乳剂