

特效进口杀地下害虫蚜虫蓟马线虫等美国富美实味南丹1公斤*20袋

产品名称	特效进口杀地下害虫蚜虫蓟马线虫等美国富美实味南丹1公斤*20袋
公司名称	安徽徽商农家福有限公司
价格	面议
规格参数	剂型:颗粒剂 有效成分含量:3(%) 品牌:美国富美实
公司地址	安徽省合肥市包河区芜湖路258号
联系电话	13305697010 14705511356

产品详情

农业领域

广谱、高效、低残留、高毒性的氨基甲酸酯类杀虫、杀螨、杀线虫剂。具有内吸、触杀、胃毒作用，并有一定的杀卵作用，持效期较长，一般在土壤中半衰期为30~60d。可用于防治水稻螟虫、稻蓟马、稻纵卷叶虫、稻飞虱、稻叶蝉、稻象甲、玉米螟、玉米切根虫、棉蚜、棉铃虫、大豆蚜、大豆食心虫、螨类及线虫等。一般用量为6.8~10g有效成分/100m²，或3%颗粒剂225~300g/100m²。棉花种子处理可先将棉种经硫酸脱绒，再用35%种衣剂（有效成分为种子干重1%）包衣处理，可防治棉蚜、地老虎等害虫。

味喃丹是氨基甲酸酯类广谱内吸杀虫杀螨杀线虫剂，可用于多种作物防治土壤内及地面上的300多种害虫和线虫。并有缩短作物生长期、促进作物生长发育从而有效提高作物产量的作用。味喃丹对昆虫的致毒方式，主要是内吸杀虫作用。药剂施于土壤作物的根基部分，根系吸收后随水分输送到茎叶部，以达到治虫的目的；味喃丹还有触杀作用。用于防治棉花蚜虫，水稻，玉米根虫，对水稻、玉米、花生等作物大部分害虫有效。[2]

使用方法：

1.防治稻螟、稻飞虱、稻蓟马、稻叶蝉、稻瘿蚊、水稻潜叶蝇、稻水象甲、稻摇蚊等，可采用以下方法：

根区施药：在播种或插秧前，每亩用3%味喃丹颗粒剂2.5-3.0千克，残效期可达40-50天。亦可在晚稻秧田播种前施用，对稻瘿蚊防治效果尤佳。

水面施药：每亩用3%味喃丹颗粒剂1.5-2.0千克，掺细土15-20千克拌匀，均匀撒施水面，保持浅水，同时可兼治蚂蝗。为增加撒布的均匀度，可将上述用药量的3%味喃丹颗粒剂与10倍量的半干土混合均匀，配制成毒土，随配随用，均匀撒施于水面。在保水好时，持效期可达30天。

播种沟施药：在陆稻种植区，3%味喃丹颗粒剂与稻种同步施入播种沟内，每亩用药量为2.0-2.5千克。

旱育秧水稻：在插秧前7-10天向秧田撒施3%呋喃丹颗粒剂，每亩用（秧田）7-10千克，即每平方米秧田撒施10-15克，可防治本田发生的水稻潜叶蝇。

2.防治棉蚜、棉蓟马、地老虎及线虫等，根据各地区的条件可选用以下方法：

播种沟施药：在棉花播种时，每亩用3%呋喃丹颗粒剂1.5-2.0千克，与种子同步施入播种沟内。用机动播种机带有定量下药装置施药，则既准确又安全。

根侧追施：一般采用沟施或穴施方法进行追施，沟施每亩用3%呋喃丹颗粒剂2-3千克，距棉株10-15厘米沿垄开沟，深度为5-10厘米，施药后即覆土。穴施以每穴施3%颗粒剂0.5-1.0克为宜，在追施后如能浇水，效果更好，一般在施药4-5天后才能发挥药效。

种子处理：棉种要先经硫酸或泡沫硫酸脱绒，每千克棉种用35%呋喃丹种子处理剂28毫升加水混合拌种。

3.防治烟草夜蛾、烟蚜、烟草根结线虫以及烟草潜叶蛾、小地老虎、蝼蛄等地下害虫。

苗床期施药：每平方米用3%呋喃丹颗粒剂15-30克，均匀撒施于苗床上面，然后翻入土中8-10厘米，移栽烟苗前1周，需再施药1次，施于土面，然后浇水以便把呋喃丹有效成分淋洗到烟苗根区，可保护烟苗移栽后早期不受害虫危害。

本田施药：移栽烟苗时在移栽穴内施3%呋喃丹颗粒剂1-1.5克。

4.防治甘蔗害虫：呋喃丹对蔗螟、金针虫、甘蔗蚜虫、甘蔗蓟马及甘蔗线虫等有效，均可采取土壤施药法，于播种沟内施颗粒剂，每亩用3%呋喃丹颗粒剂2.2-4.4千克，施药后覆土。

5.防治大豆及花生害虫。

大豆蚜、大豆根潜蝇及大豆胞囊线虫：在播种沟内施药防治，每亩用3%呋喃丹颗粒剂2.2-4.4千克，施药后覆土。

花生蚜、斜纹夜蛾及根结线虫：在播种期采取带状施药的方法，带宽30-40厘米，每亩用3%呋喃丹颗粒剂4-5千克，施药后翻入10-15厘米中。在花生成株期，可侧开沟施药，每10米长沟内施3%呋喃丹颗粒剂33克，然后覆土。

6.防治玉米害虫：用3%呋喃丹颗粒剂，于玉米喇叭口期按照3-4粒/株的剂量逐株放入玉米叶心（喇叭口），可达到良好的防虫效果。另外每千克玉米种子用35%呋喃丹种子处理剂28毫升，加水30毫升混合拌种，可有效地防治地下害虫。

7.防治甜菜、蔬菜害虫：35%呋喃丹种子处理剂用于甜菜、油菜等多种作物拌种，防治幼苗期跳甲、象甲、蓟马、蚜虫等多种害虫。具有粘着力强。展着均匀、不易脱落、成膜性好、干燥快、有光泽、缓释等优点。甜菜每千克种子用35%呋喃丹种子处理剂23-28毫升，加40-50毫升水混合均匀后拌种。如兼防甜菜立枯病可加50%福美双可湿性粉剂8克加70%土菌消可湿性粉剂5克加增产菌浓缩液5毫升混合拌种，拌药最好用拌药机。油菜每千克种子用35%呋喃丹种子处理剂23-28毫升，加水30-40毫升加50%福美双可湿性粉剂8克加70%土菌消可湿性粉剂5克加增产菌浓缩液5毫升混合拌种，可做到病虫兼治，培育壮苗。

本产品的剂型是颗粒剂，有效成分含量是3（%），品牌是美国富美实，用途是杀地下害虫，生产厂家是美国富美实，规格是1公斤*20袋