

公司低价批发优质代森锌65% 可湿性 保护性杀菌剂 量大优惠200g

产品名称	公司低价批发优质代森锌65% 可湿性 保护性杀菌剂 量大优惠200g
公司名称	沐阳县蔬菜研究所
价格	面议
规格参数	有效成分:己挫醇 有效含量 :65 (%) 用量:一袋一壶水 (g/ha) (g/ha)
公司地址	沐城上海路龙凤家具城商住楼34号
联系电话	86-052783998551 18351198000

产品详情

瀚生 代森锌

代森锌能防治多种真菌引起的病害，但对白粉病作用差。(1) 防治马铃薯早疫病、晚疫病，西红柿早疫病、晚疫病、斑枯病、叶霉病、炭疽病、灰霉病，茄子绵疫病、褐纹病，白菜、萝卜、甘蓝霜霉病、黑斑病、白斑病、软腐病、黑腐病，瓜类炭疽病、霜霉病、疫病、蔓枯病、冬瓜绵疫，豆类炭疽病、褐斑病、锈病、火烧病等，用65%的代森锌可湿性粉剂500 - 700倍液喷雾。喷药次数根据发病情况而定，一般在发病前或发病初期开始喷第1次药，以后每隔7—10天喷1次，速喷2-3次。

(2) 防治蔬菜苗期病害，可用代森锌和五氯硝基苯做成"五代合剂"处理土壤。即用五氯硝基苯和代森锌等量混合后，按每平方米育苗床面用混合制剂8-10克。用前将药剂与适量的细土混匀；取三分之一药土撒在床面做垫土，播种后用剩下的三分之二药土作播后覆盖土用，而后用塑料薄膜覆盖床面，保持床面湿润，直到幼苗出土揭膜。

(3) 防治白菜霜霉病，蔬菜苗期病害，可用种子重量的0.3 - 0.4%进行药剂拌种。

注意事项

- (1) 葫芦科蔬菜对锌敏感，用药时要严格掌握浓度，不能过大
- (2) 不能与碱性农药混用。

(3) 本品受潮、热易分解，应存置阴凉干燥处，容器严加密封。

(4) 使用时注意不让药液溅入眼、鼻、口等，用药后要用肥皂洗净脸和手。

产品说明及使用技术：

代森锌能防治多种真菌引起的病害，但对白粉病作用差。

(1) 防治马铃薯早疫病、晚疫病，西红柿早疫病、晚疫病、斑枯病、叶霉病、炭疽病、灰霉病，茄子绵疫病、褐纹病，白菜、萝卜、甘蓝霜霉病、黑斑病、白斑病、软腐病、黑腐病，瓜类炭疽病、霜霉病、疫病、蔓枯病、冬瓜绵疫，豆类炭疽病、褐斑病、锈病、火烧病等，用80%的代森锌可湿性粉剂500 - 700倍液喷雾。喷药次数根据发病情况而定，一般在发病前或发病初期开始喷第1次药，以后每隔7—10天喷1次，速喷2-3次。

(2) 防治蔬菜苗期病害，可用代森锌和五氯硝基苯做成"五代合剂"处理土壤。即用五氯硝基苯和代森锌等量混合后，按每平方米育苗床面用混合制剂8-10克。用前将药剂与适量的细土混匀；取三分之一药土撒在床面做垫土，播种后用剩下的三分之二药土作播后覆盖土用，而后用塑料薄膜覆盖床面，保持床面湿润，直到幼苗出土揭膜。

(3) 防治白菜霜霉病，蔬菜苗期病害，可用种子重量的0.3 - 0.4%进行药剂拌种。

代森锌能防治多种真菌引起的病害，但对白粉病作用差。

(1) 防治马铃薯早疫病、晚疫病，西红柿早疫病、晚疫病、斑枯病、叶霉病、炭疽病、灰霉病，茄子绵疫病、褐纹病，白菜、萝卜、甘蓝霜霉病、黑斑病、白斑病、软腐病、黑腐病，瓜类炭疽病、霜霉病、疫病、蔓枯病、冬瓜绵疫，豆类炭疽病、褐斑病、锈病、火烧病等，用65%的代森锌可湿性粉剂500 - 700倍液喷雾。喷药次数根据发病情况而定，一般在发病前或发病初期开始喷第1次药，以后每隔7—10天喷1次，速喷2-3次。

(2) 防治蔬菜苗期病害，可用代森锌和五氯硝基苯做成"五代合剂"处理土壤。即用五氯硝基苯和代森锌等量混合后，按每平方米育苗床面用混合制剂8-10克。用前将药剂与适量的细土混匀；取三分之一药土撒在床面做垫土，播种后用剩下的三分之二药土作播后覆盖土用，而后用塑料薄膜覆盖床面，保持床面湿润，直到幼苗出土揭膜。

(3) 防治白菜霜霉病，蔬菜苗期病害，可用种子重量的0.3 - 0.4%进行药剂拌种。

注意事项：

- (1) 葫芦科蔬菜对锌敏感，用药时要严格掌握浓度，不能过大。
- (2) 不能与碱性农药混用。
- (3) 本品受潮、热易分解，应存置阴凉干燥处，容器严加密封。
- (4) 使用时注意不让药液溅入眼、鼻、口等，用药后要用肥皂洗净。

本产品的有效成分是己挫醇，有效含量是65（%），用量是一袋一壶水（g/ha）（g/ha），用途是杀菌防病，生产厂家是陕西，品牌是上格，剂型是悬浮剂