

购买蔬菜种植专用冲施肥料

产品名称	购买蔬菜种植专用冲施肥料
公司名称	河南农夫康生物科技有限责任公司
价格	350.00/盒
规格参数	品牌:农富康 型号:种植菌种 生产厂家:河南农富康生物科技
公司地址	郑州金水区花园路
联系电话	15517336226

产品详情

使用em菌种植大棚蔬菜冲施

(一) 黄瓜

黄瓜为喜温作物，种子发芽适温18~32℃，生育期适温白天20~30℃，夜间15~18℃，10℃以下停止生长，0~1℃受冻害，根系生长适温20~25℃。露地黄瓜自3月份至7月份可以排开播种，5月下旬开始分期采收。生产上大致分为春黄瓜和秋黄瓜。春黄瓜一般4月初阳畦育苗，5月初定植，5月底始收。秋黄瓜7月上旬直播，8月上旬始收。

购买蔬菜种植专用冲施肥料

农富康蔬菜种植em菌 全国咨询电话15517336226 qq 1103816009

一、培育壮苗：

种子用100倍的稀释液浸泡30分，然后用湿纱布包好，在28~30℃下催芽，胚根2mm时即可播种。因黄瓜根量较少，根再生能力弱，因此，育苗要用10×10cm塑料营养钵或纸杯，育苗用土要用配制的营养土，每钵播1粒发芽种子，盖土厚1.5cm。播种前3—5天，阳畦扣膜，浇足底水提温。播种后阳畦白天25~30℃，夜间18~20℃，一半出苗时，适当降温，白天20~22℃，夜间15~18℃，第一片真叶展开时再稍升温，白天25℃，夜间15~18℃，苗龄30天左右，苗4—5片真叶时即可定植。定植前5—7天炼苗，白天18~20℃，夜间10~12℃，适当控制浇水。

二、合理密植与植株调整：

定植时，株行距37×60cm，每亩3千株。平畦或小高畦栽培，按行距开沟、浇水，水渗一半时座苗，培土至钵土平即可。采用地膜覆盖提高地温，有利根系生长，促进地上部生育，提早收获上市。黄瓜多为主蔓结瓜，也有主侧蔓结瓜品种。主蔓结瓜品种单干整枝，侧蔓应及时摘除，只保留主蔓

，主侧蔓结瓜品种侧蔓见瓜后及时打顶。插架绑蔓：株高30cm时结合浇水及时插架，每株1根，两行一架成人字形，架高要在1.8m以上，架顶用横杆连接固定。定期绑蔓，每2~3节绑一下，使蔓弯曲向上长。蔓长到架顶时打顶，促回头瓜。

三、肥水管理:

黄瓜营养特性：黄瓜是浅根作物，根系入土浅，再生能力差，吸肥力弱。定植后，由于不断结果和采收，对营养元素需要量大。

1、苗床施肥：所用床土，一般园土占60%~70%，发酵有机肥占30%~40%。若发现黄瓜幼苗供肥不足，可用0.5%尿素和0.2%磷酸二氢钾溶液喷施。

2、基肥：基肥是黄瓜生长发育的主要养分来源，黄瓜喜有机肥，基肥应以有机肥为主，露地黄瓜每亩施腐熟有机肥2000公斤或施用发酵有机肥500公斤，埋入地下20公分，同时也可把磷肥和钾肥作基肥施入。

3、追肥：黄瓜生长内应多次追肥，但每次追肥量不宜过大。黄瓜定后，结合浇水追一次氮肥，每亩施尿素7公斤左右。从根瓜开始膨大到果实采收末期，需多次追肥。其中盛瓜期应重施，每亩宜用25%复混肥30~40公斤。

4、叶面喷肥：黄瓜定植一周后，叶面喷施1000倍农富康em菌液em稀释液，每隔一周喷一次。同时也可以使用300倍农富康em菌液em稀释液淋根。

购买蔬菜种植专用冲施肥料

农富康蔬菜种植em菌 全国咨询电话15517336226 qq 1103816009

四、病虫害防治：苗期猝倒病、沤根、灰霉病，霜霉病，枯萎病，病毒病，蚜虫，美洲斑潜蝇，白粉病，细菌性角斑病，疫病。

(二)、番茄

别名：西红柿，属茄科草本植物，原产中南美洲安第斯山脉山区。番茄果实的营养价值高，含多种氨基酸，故食味鲜美。栽培以露地为主，保护地栽培和无土栽培正迅速发展。

a、育苗

1、种子处理

浸种催芽：普遍选择采取温汤浸种，药剂消毒后催芽。（参照茄子）

2、苗期管理

苗床需施足基肥，盖膜之前，用农富康em菌液

em（简称em）500~1000倍液浇湿苗床。苗期保温，最好保持在8~22℃，假植后缓苗，看叶色施肥和浇水，保证培育丰产型壮苗条件。

b、大田管理

1、整地作畦，施足基肥，地膜覆盖，适期早定植

番茄忌重茬或与茄科作物连作，前茬最好是十字花科、黄瓜、葱蒜类或粮食作物。

植前土壤深翻，充分风化；春季作深沟高畦，畦宽1米，沟0.3米深宽。畦面略“龟背形”，底墒要足。

番茄根系发达，全生育期需要大量营养，特别如地膜覆盖的，前期无法施肥，所以必须施足基肥。每亩有机肥2~3吨，复合肥80~100公斤，或生物有机肥120~150公斤/亩。

过终霜期后，选晴朗无风天气定植，利于缓苗；定植密度由品种特性而定，一般2~3千株/亩。

购买蔬菜种植专用冲施肥料

2、肥水管理

定植时浇定根水，最好用500~1000倍农富康em菌稀释液。

基肥不足时，植后一周浇施一次提苗肥；缓苗后一直到第一花穗坐果，一般不浇水进行蹲苗。蹲苗结束后，保持忽干忽湿，根据长势快定是否追肥，及施肥量。

增施磷、钾肥；多施农富康em菌液

，以提高土壤中有效态养分供作物吸收。可以7~10天施次，淋根和喷施交叉进行，喷施浓度300~500倍，淋施可稀些。

3、植株调整

搭架绑蔓：支架可采用单支柱、人字架、篱笆架等方式。

番茄分枝能力强，叶腋抽生侧枝及时摘除。整枝方式根据生长类型、栽培目的、密度、肥力水平等定，但注意：病枝早除；第一花序下的侧枝及其它侧枝，即使不留作结果枝的也不宜过早打掉；结合整枝进行绑蔓及株型矫正，打杈摘心晴天进行；整枝后喷施一次em原液，以促伤口愈合。

了解农富康产品详情可咨询电话15517336226 咨询qq 1103816009