

4月龄的种鸽 95 (%)

产品名称	4月龄的种鸽 95 (%)
公司名称	南通市港闸区新园鸽场
价格	50.00/只
规格参数	成活率:95 (%) 繁育性能:14 (只/年) 品种:石岐鸽
公司地址	中国 江苏 南通市 唐闸镇街道新园村三组7号-1
联系电话	86 0513 85546066 13003552897

产品详情

成活率	95 (%)	繁育性能	14 (只/年)
品种	石岐鸽	体重	0.5 (kg)
肉品质	98 (%)	屠宰率	72 (%)
新奇创意项目	报名	用途	种鸽

鸽子常见病的防治

1、鸽痘

鸽痘对雏鸽与青年鸽危害较大，有皮肤型和黏膜型两种。皮肤型鸽痘症状：口角、眼睑、肛门、脚趾、少羽毛的皮肤处长出黄豆般结节，内含液体，3-4周后，痂皮脱落，留下灰白色疤痕，死亡率不高。

黏膜型鸽痘症状：口腔、咽喉黏膜红肿，形成一层黄白色假膜，导致采食、吞咽与呼吸困难，死亡率较高，多发于秋冬季节。

防治：搞好环境卫生，保持鸽舍干燥。预防可用鸡胚化鸽痘弱毒疫苗，翅部刺种。

治疗：每只病鸽一次口服金霉素50毫克，也可清除脓疮，涂擦硫磺软膏、碘甘油或用浓盐水涂擦剥离结痂处。

2、肠胃炎

肉鸽患肠胃炎后，主要表现为羽毛松乱，食欲不振，腹泻。如果腹泻时粪中带血，证明病情已相当严重。对患肠胃炎的肉鸽要停喂玉米、豌豆之类硬食，最好将小麦浸泡后再喂，以助消化。同时，给肉鸽服用磺胺胍片，每只用量为1/8-1/4片，日服3次，直至痊愈。

3、球虫病

成年鸽多为虫卵携带者，很少发病，而3-5月龄雏鸽则易感染，死亡率较高。病鸽表现为食欲减退，消化不良，两翅下垂，严重者排红褐色粪便，镜检可见圆形卵囊，剖检可见肠道黏膜充血。

防治：搞好鸽舍卫生，及时清除粪便，保持鸽舍干燥，网上喂养可降低本病发生率。加强饲养管理，成年鸽和幼鸽分群饲养。饲料应富含维生素、特别是维生素a和维生素k，以增强机体抗病力。易发病季节可用药物预防：磺胺二甲嘧啶，预防浓度为0.25%混饲或0.1%饮水。治疗浓度为0.5%混饲或0.2%饮水，连用3天，停2天，再用3天；磺胺脒0.5%-1%混饲，连用3天，停3天，再用3天。

4、嗉囊积食

鸽子嗉囊积食时，主要表现为食欲不振，精神沉郁，嗉囊中食物结团，造成此病的主要原因是由于鸽子过度饱食，饲料不能及时送入胃中而停留在嗉囊中。治疗此病，可用2%的盐水给鸽子灌服，随即用手轻揉嗉囊中硬块，使嗉囊中食物软化，便可治愈。经灌盐水后如不见效，则必须将嗉囊开刀缝合，数日即愈。

5、鸽副伤寒

本病由沙门氏杆菌引起，又称鸽沙门氏杆菌病。受凉、营养不良等为本病的诱发因素。肠型：主要症状是肠炎、腹泻、排恶臭稀粪。关节型：多呈单侧性关节肿胀，僵硬，以肘关节、踝关节多见，翼、脚麻痹，常见单侧翼下垂，食欲减退，饮水增多，精神沉郁，闭眼昏睡。神经型：病鸽头颈歪斜，头向后仰或作转圈运动，剖检可见肠粘膜麸状溃疡，个别病鸽肝脏轻度肿大，表面有少量黄白色坏死灶。

防治：搞好卫生防疫工作，对新引进的种鸽连喂3-5天金霉素，定期在饮水中或饲料中投服抗菌素、维生素；淘汰患病鸽；严重的饮服萘诺沙星、环丙沙星，每克纯粉兑水20公斤，每天喂饮2次，连饮3-5天为一个疗程，一般应重复2-3个疗程。

6、鸽毛滴虫病

本病病原厌氧原虫，雏鸽死亡率较高，口腔咽喉处有干酪样渗出的，呼吸困难，治疗用灭滴灵（甲硝唑）每50公斤饲料加25克，连用5天。

五、经济社会效益分析

目前，种鸽价格为150元/对，商品乳鸽市场价为17元/只。一对种鸽每年生产乳鸽按8对计算，如果作为种鸽出售，则可产生经济效益1200元，销售3万对种鸽则可产生450万元的经济效益。作为商品乳鸽出售，每对种鸽可获得经济效益272元，3万只乳鸽可产生经济效益51万元。每对种鸽的年生产成本约160元，因此，一对种鸽每年至少可获得110元的纯收入。

种鸽年增加乳鸽数最低1.4对，按种鸽销售，可增加收入210元，按商品乳鸽出售，可增加收入47元，饲料利用率提高6.4%以上，按每对种鸽节约饲料3kg、3.2元/kg计算，则可减少饲料成本10元左右。每对种鸽合计增加收入为57—220元，效益提高明显。